


Vaksina kundër fruthit, shytave dhe rubeolës

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



Sëmundjet fruthi, shytat dhe rubeola janë shumë ngjitëse. Ne rekomandojmë që ti të vaksinohesh nëse tashmë nuk e ke marrë vaksinën ose ke pasur ndonjë nga këto sëmundje.

Sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund är mycket smittsamma. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du inte redan fått vaccinet eller har haft någon av sjukdomarna.



Vaksinimi është pa pagesë.

Vaccinationen är gratis.



Disa persona nuk do të vaksinohen. Mjeku apo infermierja duhet të dijë nëse ti je alergjik / alergjike, i / e sëmurë, shtatzënë dhe cilat ilaçe i pi ti.

Vissa personer ska inte vaccineras. Läkaren eller sjuksköterskan behöver veta om du är allergisk, sjuk, gravid och vilka mediciner du äter.


Vaksina kundër fruthit, shytave dhe rubeolës

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



Ti duhet ta lëshë një provë të urinës nëse ekziston mundësia që ti të jeshë shtatzënë. Testi mund të tregojë nëse ti je ose nuk je shtatzënë.

Du behöver lämna ett urinprov om det finns möjlighet att du är gravid. Provet kan visa om du är gravid eller inte.



Kur ti vaksinohesh ty do të jepet një injeksion në krahun tënd të sipërm. Kjo mund të shkaktojë pak dhembje. Ti gjithashtu mund të ndjeshë dhembje në zonë disa ditë më pas.

När du vaccineras kommer du att få en spruta i din överarm. Det kan göra lite ont. Du kan också känna smärta i området några dagar efteråt.



1-2 javë pas injeksionit mund të keshë temperaturë dhe skuqje të lëkurës. Kjo nuk është e rrezikshme dhe vetvetiu kalon. Kontakto 1177 për të marrë këshilla mjekësore nëse ti je i / e shqetësuar.

1-2 veckor efter sprutan kan du få feber och hudutslag. Detta är inte farligt och går över av sig själv. Kontakta 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om du är orolig.