


## Vakcina protiv malih boginja (morbilije), zauški (parotitisa) i crvenke (rubeole)

### Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



Bolesti male boginje (morbilija), zauške (parotitis) i crvenka (rubeola) su veoma zarazne. Preporučujemo da se vakcinišete ako već niste primili vakcinu ili imali neku od tih bolesti.

Sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund är mycket smittsamma. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du inte redan fått vaccinet eller har haft någon av sjukdomarna.



Vakcinacija je besplatna.

Vaccinationen är gratis.



Neke osobe se ne mogu vakcinisati. Doktor ili medicinska sestra trebaju znati da li imate alergije, da li ste bolesni ili u drugom stanju, te koje lijekove pijete.

Vissa personer ska inte vaccineras. Läkaren eller sjuksköterskan behöver veta om du är allergisk, sjuk, gravid och vilka mediciner du äter.


## Vakcina protiv malih boginja (morbilije), zauški (parotitisa) i crvenke (rubeole)

### Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



Morate predati uzorak mokraće ukoliko postoji mogućnost da ste u drugom stanju. Test može pokazati da li ste u drugom stanju ili ne.

Du behöver lämna ett urinprov om det finns möjlighet att du är gravid. Provet kan visa om du är gravid eller inte.



Prilikom vakcinacije dobit ćete injekciju u nadlakticu. To može malo da boli. Takođe možete osjećati bol u tom predjelu tokom nekoliko sljedećih dana.

När du vaccineras kommer du att få en spruta i din överarm. Det kan göra lite ont. Du kan också känna smärta i området några dagar efteråt.



1-2 sedmice nakon injekcije možete dobiti povišenu temperaturu i ekcem na koži. To nije opasno i prolazi samo od sebe. Obratite se na 1177 za zdravstvene savjete ukoliko ste uznemireni.

1-2 veckor efter sprutan kan du få feber och hudutslag. Detta är inte farligt och går över av sig själv. Kontakta 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om du är orolig.