


واکسین سرخکان، التهاب حاد غده بناگوش (کله چرک) و نبتکان (نمدکان یا حصبه آلمانی)

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



بیماریهای سرخکان، کله چرک و نبتکان بسیار ساری می باشند. ما توصیه می کنیم که اگر شما قبلاً واکسین نه زده باشید یا یکی از این بیماریها را سپری نه کرده باشید خود را واکسین بزنید.

Sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund är mycket smittsamma. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du inte redan fått vaccinet eller har haft någon av sjukdomarna.



واکسین زنی رایگان می باشد.

Vaccinationen är gratis.






عده ای از مردم نه باید واکسین شوند. دکتور یا پرستار می خواهد بداند که آیا شما حساسیت دارید، بیمار هستید، حامله می باشید و هم اینکه شما چی دواهایی را استعمال می کنید.

Vissa personer ska inte vaccineras. Läkaren eller sjuksköterskan behöver veta om du är allergisk, sjuk, gravid och vilka mediciner du äter.

واکسین سرخکان، التهاب حاد غده بناگوش (کله چَرک) و نَبَتَکان (نمدکان یا حصبه آلمانی)

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

	<p>لازم است که شما آزمایش پیشاب بدهید تا دیده شود که آیا ممکن است شما حامله شده باشید. این آزمایش نشان میدهد که آیا شما حامله هستید یا نه.</p> <p>Du behöver lämna ett urinprov om det finns möjlighet att du är gravid. Provet kan visa om du är gravid eller inte.</p>
	<p>واکسین در قسمت بالای بازو (عضد) شما تزریق می شود. ممکن است که اندکی درد داشته باشد. این هم ممکن است که چند روز بعد از تزریق، شما در همان ناحیه احساس درد بکنید.</p> <p>När du vaccineras kommer du att få en spruta i din överarm. Det kan göra lite ont. Du kan också känna smärta i området några dagar efteråt.</p>
	<p>۱ تا ۲ هفته پس از امپول، ممکن است که برای شما تب و دانه های جلدی عارض گردد. این خطرناک نیست و خود بخود رفع می گردد. هرگاه شما نگران باشید برای دریافت مشوره با مرکز رهنمایی خدمات درمانی با شماره ۱۱۷ تماس بگیرید.</p> <p>1-2 veckor efter sprutan kan du få feber och hudutslag. Detta är inte farligt och går över av sig själv. Kontakta 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om du är orolig.</p>