


Aşîya ji bo sorik, binguhkî û sorika almanî

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



Nexweşîya sorik û binguhkî û sorika almanî gelek têger in. Em tawsiye dîkin ku hûn aşîyê li xwe bi bixî ku te berê ev aşî li xwe nexistîbin an jî bi van nexweşîyan neketibî.

Sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund är mycket smittsamma. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du inte redan fått vaccinet eller har haft någon av sjukdomarna.



Ev aşî beleş in.

Vaccinationen är gratis.



Dê ev aşî li hîn kesan nekeve. Hekîm an jî nojdar lazim e bizanin ku alerjiya te hebe, ku tu nexweş bî, ducanî bî û kîjan dermanan dixwî.

Vissa personer ska inte vaccineras. Läkaren eller sjuksköterskan behöver veta om du är allergisk, sjuk, gravid och vilka mediciner du äter.


Aşya ji bo sorik, binguhkî û sorika almanî

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



Ku gumana ducaniyê hebe hîngê pêwîst e tu nimûna mîzê bidî. Nimûne nîşan dide ka tu ducanî yî an jî na.

Du behöver lämna ett urinprov om det finns möjlighet att du är gravid. Provet kan visa om du är gravid eller inte.



Dema aşî bê dayîn hîngê derzî li jora milê te tê dayîn. Dibe ku hinekî bêşê. Her wiha dê çend roja êşa te hebe li dora cîhê ku derzî lêketî.

När du vaccineras kommer du att få en spruta i din överarm. Det kan göra lite ont. Du kan också känna smärta i området några dagar efteråt.



1-2 hefteyan bi dû aşiyê re dê germa laşê te hebe û li canê te jêdaderî û lûr hebin. Ev ne rewşeke xeter e û wê ji ber xwe ve derbas bibe. Ku endîşeyên te hebin bi 1177 re têkildar be ji bo ku amojgeriya lênêrîna nexweşan bistînî.

1-2 veckor efter sprutan kan du få feber och hudutslag. Detta är inte farligt och går över av sig själv. Kontakta 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om du är orolig.