


د شری (سرخکان)، کله چرک (پاروتیت) او نمدکان (جرمن میزلس یا آلمانی حصبه) په مقابل کی واکسینونه

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



شری، کله چرک و آلمانی حصبه ډیر ساری ناروغی دی. موږ توصیه کوو چی تاسی دا واکسینونه ولگوی که تاسی تر اوسه پوری واکسین شوی نه یاست یا دا چی یو د دغو ناروغیو څخه مو نه وی تیر کړی.

Sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund är mycket smittsamma. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du inte redan fått vaccinet eller har haft någon av sjukdomarna.



واکسین لگول مفت دی.

Vaccinationen är gratis.






بعضی خلک نه باید چی واکسین شی. ډاکټر یا پرستار لازم گڼی چی پوه شی آیا تاسی حساسیت (الرجی) لری، ناروغ یاست، حامله یاست او دا چی تاسی کومی دواگانی خوری.

Vissa personer ska inte vaccineras. Läkaren eller sjuksköterskan behöver veta om du är allergisk, sjuk, gravid och vilka mediciner du äter.

د شری (سرخکان)، کله چرک (پاروتیت) او نمډکان (جرمن میزلس یا آلمانی حصبه) په مقابل کی واکسینونه

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

	<p>ستاسی څخه باید د تشی متیازی معاینه واخیستل شی او وکتل شی چی آیا ددی امکان شته چی ستاسی حامله یاست. دا ټسټ بڼکاره کوی چی آیا تاسی حامله یاست یا نه.</p> <p>Du behöver lämna ett urinprov om det finns möjlighet att du är gravid. Provet kan visa om du är gravid eller inte.</p>
	<p>کله چی تاسی واکسین شی، ستن ستاسی پر بازو باندی لگول کیږی. کیدای شی چی یو څه درد ولری. دا هم کیدای شی چی څو ورځی وروسته تاسی پر دغه ځای باندی د درد احساس وکړی.</p> <p>När du vaccineras kommer du att få en spruta i din överarm. Det kan göra lite ont. Du kan också känna smärta i området några dagar efteråt.</p>
	<p>د پیچکاری څخه ۱ یا ۲ هفته وروسته کیدای شی چی تاسی تبه وکړی او ستاسی پر بدن باندی دانی پیدا شی. دا خطرناکه نه ده او خود په خوده ورکېږی. که تاسی پریشانه یاست د روغتیایی چارو مشورتی مرکز سره تماس ونیسی. شمیره: ۱۱۷۷</p> <p>1-2 veckor efter sprutan kan du få feber och hudutslag. Detta är inte farligt och går över av sig själv. Kontakta 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om du är orolig.</p>