


## Vakcina protiv tikne boginje, zauške hem rubeola

### Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



O tikne boginje, zauške hem rubeola i but prenosljivo nasvaliba. Amen preporučinaja te vakcinirinetut te nasijan vakcinirimo ili te na sijan sine nasvalo kotaro akala nasvaliba.

Sjukdomarna mässling, påssjuka och röda hund är mycket smittsamma. Vi rekommenderar att du vaccinerar dig om du inte redan fått vaccinet eller har haft någon av sjukdomarna.



I vakcina i bizo phare.

Vaccinationen är gratis.



Podajek manuša na valjani te vakcinirinenpes. O doktori ili i sestra valjani te džanen dali sijan alergično, nasvalo, khamni hem save hapija pieja.

Vissa personer ska inte vaccineras. Läkaren eller sjuksköterskan behöver veta om du är allergisk, sjuk, gravid och vilka mediciner du äter.

## Vakcina protiv tikne boginje, zauške hem rubeola

### Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund



Tu valjanii te muke proba kotar i urina te dikelpes dali sijan khamni. O probe ka sikaven dali sijan khamni ili na sijan.

Du behöver lämna ett urinprov om det finns möjlighet att du är gravid. Provet kan visa om du är gravid eller inte.



I vakcina ka dobine ki musik. Harica ka dhukal tut. Tu šaj te osetine dukh ko odova than dajek divesa posle odova.

När du vaccineras kommer du att få en spruta i din överarm. Det kan göra lite ont. Du kan också känna smärta i området några dagar efteråt.



1-2 kurke pali vakcina šaj te dobine temperatura hem osipija. Akava nane opasno hem nakela korkori pestar. Kontaktirin 1177 medicinsko sovetijengje te sekirindzantut.

1-2 veckor efter sprutan kan du få feber och hudutslag. Detta är inte farligt och går över av sig själv. Kontakta 1177 för att få sjukvårdsrådgivning om du är orolig.