

Till dig som behandlas med Multaq (dronedraron)

Varför behandlas du med Multaq?

Behandling med Multaq minskar risken för att få återfall i förmaksflimmer och kan också ge mindre besvärande symtom vid ett eventuellt återfall av förmaksflimmer. Återfall av förmaksflimmer behöver inte ses som ett behandlingsmisslyckande. Om du får återfall av förmaksflimmer bör du rådgöra med din behandlande läkare innan du avslutar behandlingen.

Hur och när ska du ta medicinen?

Det är viktigt att du följer den angivna doseringen. Förändra eller avbryt inte behandlingen utan att ta kontakt med din behandlande läkare. Multaq tas morgon och kväll vid samma tidpunkt och alltid tillsammans med måltid för att uppnå bästa effekt och för att minska risken för magbesvär. Om du glömt att ta en tablett bör du försöka ta den så fort som möjligt eller vänta till nästa dos i stället. Du ska aldrig ta någon extra.

Biverkningar

Trötthet, magbesvär, illamående och lös avföring är vanligt och förekommer oftast i början av behandlingen för att sedan avta. Du kan läsa mer om biverkningarna i bipacksedeln som följer med läkemedlet.

Kontroller

Behandling med Multaq innebär regelbundna blodprovskontroller av levervärden för att tidigt fånga upp eventuella biverkningar. Du kommer att få kallelser för blodprovstagning.

Information om förmaksflimmer på nätet:

www.1177.se

www.hjart-lung.se

Frågor och funderingar?

Vid frågor, vänligen ring Kontaktpunkten på 031-342 24 00 eller kontakta oss via 1177 e-tjänster.

Med vänlig hälsning

Personalen på Hjärtmottagning Östra