

Till dig som ska genomgå Baklofentest

Eftersom du kan behöva sederas inför ingreppet vill vi att du är **fastande från midnatt dagen för inläggningen**. Det betyder att du inte får äta eller dricka något från midnatt. Du får dock ta dina mediciner med vatten.

Om du äter **blodförtunnande läkemedel** så behöver dessa **sättas ut inför Baklofentest**. Vissa smärtlindrande läkemedel har också blodförtunnande effekt.

Om du har några frågor angående detta kan du kontakta avdelning 134 Ryggmärgsskador på telefon 031-342 11 34.

Läkemedel	Sluta med läkemedlet
Clopidogrel, Plavix, Grepid et cetera (<i>klopidogrel</i>)	7 dygn innan inläggning
Trombyl, Aspirin, Babyl, Treo et cetera (<i>acetylsalicylsyra</i>)	5 dygn innan inläggning
Waran (<i>warfarin</i>)	5 dygn innan inläggning
Eliquis (<i>apixaban</i>)	48 timmar innan inläggning
Pradaxa (<i>dabigatranetexilat</i>)	48 timmar innan inläggning
Pronaxen, Naprocur, Naproxen et cetera (<i>naproxen</i>)	48 timmar innan inläggning
Xarelto (<i>rivaroxaban</i>)	48 timmar innan inläggning
Fragmin (<i>dalteparin</i>)	24 timmar innan inläggning
Innohep (<i>tinzaparin</i>)	24 timmar innan inläggning
Ipren, Brufen, Ibumetin, Ibuprofen, Iprena, Nurofen et cetera (<i>ibuprofen</i>)	12 timmar innan inläggning
Voltaren, Diklofenak, Arthrotec et cetera (<i>diklofenak</i>)	12 timmar innan inläggning