Information till dig som behandlas med Cordarone© (amiodarone)

Varför behandlas du med Cordarone?

Cordarone används mot hjärtrytmrubbningar, till exempel förmaksflimmer och kammartakykardi (snabb puls). Cordarone hjälper hjärtat att slå i normal takt genom att minska den elektriska retbarheten i hjärtat.

Hur och när ska du ta medicinen?

Dosen är individuell. Startdosen är ofta hög och minskas sedan efterhand till lämplig underhållsdos. Effekten sätter in långsamt och maximal effekt ses vanligtvis efter några veckor.

Ta medicinen ungefär vid samma tidpunkt och gärna ihop med måltid, det minskar risken för magbesvär. Tabletterna bör inte utsättas för direkt ljus.

Om du glömt att ta din medicin bör du försöka ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra.

Följ de anvisningar om dosering som du fått, detta för att få bästa resultat av behandlingen och samtidigt minska risken för biverkningar. Det är viktigt att inte förändra dosen eller avbryta behandlingen utan att ta kontakt med behandlande läkare.

Biverkningar

Cordarone kan ibland ge biverkningar. En del biverkningar, så som illamående, magbesvär, huvudvärk, konstiga drömmar, trötthet eller yrsel, uppträder oftast i början av medicineringen och minskar sedan efter hand. Andra biverkningar kan kvarstå upp till flera månader efter avslutad behandling, detta eftersom det tar lång tid innan Cordarone försvinner ur kroppen. För mer detaljerad information hänvisas till bipacksedeln.

Hud: Många som behandlas med Cordarone blir ”överkänsliga” mot solljus, både direkt sol men även solljus som reflekteras från snö och vatten. Om du utsätts för detta kan du få utslag, klåda och missfärgning av huden. Det är därför viktigt att skydda sig mot solljus med en effektiv solkräm SPF 50 samt använda långärmade kläder, solhatt osv.

Postadress:
Verksamhet Kardiologi
Hjärtmottagning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:
031-342 10 00

Webbplats:
sahlgrenska.se

Ämnesomsättning: Cordarone kan påverka sköldkörteln/ämnesomsättningen. Symtom på detta kan vara ökad värmekänsla, ökad frusenhet, oro eller trötthet.

Lungor: Lungbesvär är en sällsynt biverkan men om den uppträder behöver den behandlas. Symtomen är andfåddhet eller besvärlig hosta.

Ögon: Cordarone kan ge inlagringar i ögats hornhinna. Dessa förvinner när du slutar ta medicinen.

Cordarone och andra läkemedel

Informera alltid vårdpersonal om att du tar Cordarone då vissa kombinationer av läkemedel är olämpliga. Detta kan gälla även natur- och hälsokostpreparat. Om du behandlas med Waran kan det innebära att PK-prov behöver tas tätare under början av behandlingen.

Kontroller

Behandling med Cordarone innebär regelbundna blodprovskontroller. Då kontrolleras prover för ämnesomsättningen (sköldkörteln) och levern. Kontrollerna syftar till att tidigt fånga upp eventuella biverkningar. Du kommer att få kallelser för blodprovstagning och för regelbundna EKG-kontroller.

Information om förmaksflimmer på nätet:

www.1177.se
www.hjart-lung.se

Rådgivning till dig som är patient på Hjärtmottagningens Cordaronemottagning

Telefon: 031-342 4830
Måndagar kl. 08.00-09.00
Onsdagar kl 12.00-13.00
Torsdagar kl 12.00 -13.00

Rådgivning övrig tid

Vårdguiden 1177.se om du har anslutit dig till verksamhetsområde Kardiologi, Hjärtmottagning.

Kontakt verksamhet Kardiologi

Måndag-fredag: telefontid klockan 08.00-10.00. Telefonnummer: 031-342 40 50

Postadress:
Verksamhet Kardiologi
Hjärtmottagning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:
031-342 10 00

Webbplats:
sahlgrenska.se