

## Information om kranskärlsröntgen och ev kranskärlsvidgning (PCI)

Detta är information till dig som ska genomgå en kranskärlsröntgen. Vi erbjuder dig också en informationsfilm om kranskärlsröntgen. För att titta på den loggar du in med ditt mobila bank-id på dina sidor på 1177 och väljer fliken Stöd och behandling.

Du har fått tid för kranskärlsröntgen på Intervention 2- Dagvården, verksamhetsområde Kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det kan finnas olika anledningar till att en kranskärlsröntgen utförs: kärlekskramp, utredning inför en eventuell hjärtoperation t.ex. klaffbyte, vid en hjärtsviktsutredning eller inför andra planerade operationer.

Inskrivning sker via telefon vanligen 1-2 veckor före ingreppet, men kan också ske en eller någon dag innan din undersökning. Du får då information av sjuksköterska som ringer upp dig på en ungefärlig tid. Vid detta samtal ska du ta upp frågor du har om ingreppet, t.ex. om sjukskrivning eller behandling efter ingreppet. Blodprover tar du **inom sju dagar innan din kranskärlsröntgen**. Du ska ta på någon av Sahlgrenska Universitetssjukhusets provtagningscentraler. Bor du utanför Göteborgsområdet kan du ta prover på din vårdcentral, med hjälp av den remiss som vi skickar hem till dig.

### På undersökningsdagen

- Du får inte använda tobak innan din kranskärlsröntgen.
- Ta din morgonmedicin, men inte dina vätskedrivande läkemedel. Har du diabetes och behandlas med Metformin eller Glukophage får du inte ta dessa på behandlingsdagen samt de 3 följande dagarna efter kranskärlsröntgen.
- Ät frukost som vanligt. Du får inte använda tobak, inklusive snus.
- Duscha hemma som vanligt med tvåål och hårschampo innan du kommer till sjukhuset.
- Du har fått en preliminär tid, vilket innebär att din undersökning kommer att ske under den aktuella dagen. Var beredd på att väntetid kan uppstå då det pågår akut verksamhet samtidigt.
- Ta gärna med något att läsa, då väntetiden ibland kan kännas lång.
- Ta med inneskor.
- -Om du behandlas för någon annan sjukdom än för dina hjärtproblem, ta med dig dina mediciner för detta.
- Lämna värdesaker och pengar hemma.

- Kom ihåg att ta med fotolegitimation.

Betalning sker genom att en faktura kommer att skickas hem till dig avseende det aktuella vårdtillfället.

### Kranskärlsröntgen


Före ingreppet får du en droppslang i armen. På undersökningsbordet blir du steriltvättad runt handleden eller i ljumsken. Därefter klär vi in dig i sterila dukar.

Efter att bedövning givits på stickstället och ev. lugnande eller smärtstillande läkemedel, förs en tunn kateter via ett blodkärl i armen eller ljumsken upp till hjärtat. Detta kan ibland medföra obehag, framför allt vid undersökning genom blodkärl i armen.

Kontrastmedel ges för att se om det finns några förträngningar i hjärtats kranskärl. Om förträngningarna bedöms lämpliga att åtgärda med ballongvidgning, så kallad PCI görs det ofta på en gång. Ibland bedömer hjärtläkaren att bästa åtgärd är medicinsk behandling eller att kranskärlen behöver åtgärdas vid en thoraxkirurgisk operation (by-pass operation).

### Ballongvidgning

Om kranskärlsröntgen visar behandlingskrävande förträngningar kan det bli aktuellt med ballongvidgning vid samma tillfälle. Via katetern som förts in i hjärtats kranskärl vidgas förträngningen med en ballong och ett stent (metallnät) planteras (läggs in). Stentet minskar risken för att förträngningen kommer tillbaka. Under proceduren kan du uppleva viss bröstsmärta. Då får du smärtstillande eller lugnande läkemedel.



Efter ingreppet

---

Du kommer att ha ett tryckförband över instickstället i minst 4 timmar efter ingreppet. Du får vara uppe och gå direkt efter du kommit tillbaka till Dagvården. Tänk på att hålla armen i högläge. Tänk på att undvika tunga lyft de första dagarna efter ditt ingrepp.

### Komplikationer

Komplikationer i anslutning till ingrepp förekommer. Kateterns spets kan orsaka lokala skador i sjuka och sköra kärl och komplikationer av större allvarlighetsgrad innefattar störningar i hjärtats och hjärnans blodcirkulation. Dessa är dock sällsynta och risken är < 1 %.

Blåmärken med en liten svullnad på och omkring stickställen förekommer ofta. Dagarna efter ingreppet kan man uppleva smärta i underarmen vid insticksstället.

Vid svåra symptom ska du alltid kontakta oss.

**Du får inte köra bil hem själv efter ditt ingrepp på grund av blödningsrisk samt att du kommer att få lugnande läkemedel under tiden som undersökningen pågår.**

Vår läkare skriver endast intyg om att det finns behov av taxi för hemresan efter vårdtillfället. Om du anser att ditt tillstånd kräver taxi även vid resan till sjukhuset ska du kontakta Sjukresor Regionkontoret tfn. 020-919090. En egenavgift tillkommer alltid vid taxiresa.

### Kontaktuppgifter efter ditt ingrepp

Du når oss via vårdguidens e-tjänster, 1177 eller

### Kontakt verksamhet Kardiologi:

Måndag - fredag 08.00-11.00. Telefon: 031-342 4050

Om du önskar mer information eller har speciella önskemål får du gärna kontakta oss på Intervention 2. Telefon 031-342 4857, måndag - fredag mellan klockan 09.00-10.00.

Det går också bra att kontakta oss via 1177. Sök på Kardiologi Dagvård avdelning 26 på Sahlgrenskas hemsida och klicka på fråga om kranskärlsröntgen för att komma vidare.

Välkommen!