Patientinformation till dig som ska få Zoledronsyra (Aclasta)

Du har blivit kallad för att få ett dropp med läkemedlet Zoledronsyra (Aclasta). Läkemedlet ges en gång per år och ersätter tidigare medicinering (Fosamax, Fosavance, Alendronat, Optinate eller Didronate) som du har haft för benskörhet (dock inte D-vitamin och kalkmedicinering). Infusionen (droppet) ges under 30 minuter och hela besöket beräknas ta ca 1,5-2 timmar.

Det är viktigt att du dricker extra mycket dagen före, under infusions-dagen samt dagen efter (ca 1 liter extra). Drick ett par glas innan du kommer till mottagningen. Du blir också bjuden på dryck under infusionen.

Du bör ha ca 20 tabletter Paracetamol (Panodil, Alvedon eller Reliv) på 500 mg hemma inför behandlingen, då läkemedlet kan ge biverkningar i form av influensaliknande värk i kroppen och allmän sjukdomskänsla. Därför bör du ta 2 tabletter Paracetamol på 500 mg cirka 6 timmar innan du kommer till mottagningen och 2 tabletter 3 gånger dagligen behandlingsdagen och därefter vid behov.

Om du har tandproblem eller håller på med någon tandbehandling, så hör av dig till oss då man inte bör behandlas med Zoledronsyra samtidigt.

Innan behandling med Zoledronsyra skall man behandlas med D-vitamin och kalk. Om du inte står på sådan medicinering, hör av dig till mottagningen så ordnar vi med recept.

Endokrinmottagningen
Medicinkliniken
SU/Sahlgrenska

Vid frågor kontakta oss via 1177 eller ring 031: 342 99 79