

Varför ska du göra undersökningen?

Fettvävsbiopsi är en undersökning som görs vid misstänkt AL-amyloidos.

Undersökningen innebär att läkaren, under lokalbedövning, skär ut en liten bit av fettväven från buken för att skicka för analys.

Blodförtunnande läkemedel

Trombyl kan du ta som vanligt. Tar du annat blodförtunnade läkemedel kontakta oss för instruktioner

Behandlas du med Waran så skall du ta ett PK-värde en vecka före undersökningen och skriva på AK-brevet att du skall göra en fettvävsbiopsi. AK-enheten meddelar dig hur du skall minska Warandosen inför undersökningen.

Förberedelser

För att minska obehag i samband med undersökningen rekommenderar vi att du tar smärtstillande i form av Panodil eller Alvedon enligt rekommendation på förpackningen ca 1 timme före undersökningen. Om du känner dig mycket orolig inför ingreppet kan du få något lugnande på hematologimottagningen ca 1 timme före påbörjad undersökning. Ta i så fall kontakt med kontaktsjuksköterska i teamet på telefonnummer 031-342 73 72. Om man har fått lugnade läkemedel får man inte köra bil efteråt.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen utförs av en läkare som assisteras av en sjuksköterska och en undersköterska. Du får ligga på ryggen på en brits. Läkaren tvättar först huden med sprit, därefter bedövas huden med en injektion med lokalbedövning. Detta kan sticka och svida en kort stund. Efter att bedövningen verkat i några minuter gör läkaren ett litet snitt i huden strax nedanför naveln, och skär sedan ut 2 små bitar av fettväv. Dessa bitar skickas för analys. Snittet sys ihop med 2-3 stygn.

Postadress:

Sektionen för hematologi och koagulation
Bruna Stråket 5
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 11 40

Webbplats:

sahlgrenska.se

Förband

Du får ett plåster närmast huden och utanpå detta ett plastförband. Dessa ska sitta kvar i 10 dagar och tas bort i samband med att man tar bort stygnen. Du ska inte duscha samma dag efter undersökningen och avstå från bad till snittet är helt läkt.

Hur mår man efteråt?

När bedövningen släppt kommer du att vara öm kring snittet. Det kan ömma någon eller några dagar, upp till en vecka. Om du har ont kan du ta smärtstillande läkemedel som Alvedon eller Panodil enligt rekommendation på förpackningen. I enstaka fall kan blödning eller infektion uppkomma, var uppmärksam på om området kring snittet ser rött och irriterat ut eller om det kommer gulaktig vätska därifrån. Kontakta i så fall primärvården/distriktsköterska eller din kontaktsjuksköterska på hematologimottagningen på telefonnummer 031-342 73 72. Om förbandet lossnat ska du uppsöka distriktsköterska. Du ska undvika att träna samma dag som undersökningen.

Stygnen

Snittet på magen är sytt med 2-3 stygn. Dessa stygn ska tas bort efter ca 10 dagar och du kommer att få en remiss till primärvården för detta.

Provsvar

Det tar flera veckor, ibland månader, att analysera proverna med fettväv. Du kommer att bli kallad till ett återbesök så snart provsvaren inkommit.

Kontakt

Vid frågor, ring din kontaktsjuksköterska i teamet på telefonnummer 031-342 73 72 alt. kontakta primärvården om det gäller förbandet på magen.

2026-02-06 Revision 6

Postadress:

Sektionen för hematologi och koagulation
Bruna Stråket 5
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 11 40

Webbplats:

sahlgrenska.se