
Mätning av matstrupens funktion och 24-timmars pH-mätning i matstrupen

Undersökningen visar om det förekommer reflux av sur magsaft till matstrupen.

Hör av dig till oss så snart du fått ditt kallelsebrev, för att diskutera dina mediciner inför undersökningen, tel: 031-342 81 07.

Om undersökningen inte längre är aktuell ber vi dig boka av din tid snarast.

OBSERVERA att syrahämmande medicin, Omeprazol/Pantoprazol eller liknande, i normalfallet ska sättas ut en vecka innan undersökningen.

Du ska komma svältande, d.v.s. inte äta eller dricka efter kl. 24.00 kvällen före undersökningen. Om du har fått tid kl. 13.00 kan du äta frukost före kl. 08.00 på undersökningsdagen.

Undersökningen tar ca 1,5 timmar.

Näsan bedövas med lokalbedövande salva, Xylocain.

En smal kateter förs ner via näsan till magsäcken.

Du får svälja små klunkar med vätska och eventuellt små smörgåsbitar.

Katetern tas bort.

En pH-kateter förs ner på samma sätt och tejpas vid näsan.

Katetern är kopplad till en dosa som registrerar pH-värdet och vätsketransporten i matstrupen. OBS! Du kan ej duscha under undersökningsdygnet pga dosan.

Du kommer tillbaka efter 24 timmar för borttagande av katetern (besöket tar ca 15 min)