

Patientinformation bedövningsplåster

I samband med ert barns besök kan det bli aktuellt att ta blodprover. Bedövningsplåster (EMLA-plåster eller Tapin-plåster) används för att bedöva huden så att man kan ta blodprover utan att det gör ont.

Sätt på bedövningsplåstren minst en timma innan er bokade tid. Sätt på två plåster på olika ställen. Titta efter synliga blodkärl i armvecken i första hand och på handryggarna i andra hand.

Se till att hudytan som ska bedövas är torr och hel.

Den vita runda ytan innehåller bedövningsmedlet. Se till att plåstret kommer över blodkärlet. Linda gärna en elastisk linda över plåstret så att det har god kontakt med huden under för bästa effekt.

Om barnet inte vill ha plåster kan ni ta bedövnings salva och vira plastfolie över. Bedövningsplåster eller salva köper ni på apoteket.

Vissa prov sparas

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank.

Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se

Med vänlig hälsning

Koagulationscentrum Sahlgrenska

Postadress:

Sektionen för hematologi och koagulation
Koagulationscentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se