

Patientinformation BORN

Provtagningsförberedelser:

Fasta inför provtagning: Du ska vara fastande cirka 10 timmar innan provtagningen, även från kaffe och te, ett glas vatten får drickas inom fastetiden.

Mediciner: Läkemedel innehållande acetylsalicylsyra (till exempel Bamy, Treo, Magnecyl, med flera) eller NSAID (till exempel Ipre, Voltaren, Pronaxen, Diklofenak, Orudis, med flera) och naturläkemedel stör undersökningen.

Använd INTE sådana preparat på 10 dagar innan besöket.

Undantag: Om Trombyl (eller liknande) ordinerats för att förebygga blodpropp, var god kontakta oss.

Då det är långa väntetider för denna undersökning, kontakta oss i god tid om tiden inte passar.

Vid frågor eller behov av att av-/omboka tiden, kontakta oss på 1177.se eller ring oss på 031 – 342 83 81 mån-fre kl. 11:00-12:00.

Vissa prov sparas

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank.

Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se

Med vänlig hälsning

Koagulationscentrum Sahlgrenska

Postadress:

Sektionen för hematologi och koagulation
Koagulationscentrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se