

Ilaris (Kanakinumab)

EFFEKT

Ilaris har en inflammationsdämpande effekt genom hämning av IL-1 (interleukin- 1), vilket är en signalsubstans som bildas i samband med inflammation.

Ilaris används för att avbryta akuta giktattacker, då man ej har haft tillräcklig effekt av, eller inte tolererat, vanliga inflammationshämmande läkemedel. Ilaris används också för behandling av vissa specifika inflammatoriska febersjukdomar.

PREPARAT OCH DOSERING

Vid behandling av gikt ges Ilaris som en subkutan (under huden) injektion, i samband med en akut giktattack.

Vid behandling av inflammatoriska febersjukdomar ges subkutana injektioner enligt ett individuellt anpassat schema.

Injektionerna ges på reumatologens behandlingsenhet eller avdelning. Under Ilarisbehandlingen fortsätter man som vanligt med sina ordinarie mediciner.

KONTROLLER

Blodprover kontrolleras regelbundet och enligt särskilt schema: 2v, 4v och 8v efter injektionen, om inte din läkare eller sjuksköterska meddelar annat. Är proverna bra, hör du inget från oss. *Det är viktigt att du tar blodprover som du ordinerats för att vi skall kunna upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen.* Kontakta Reumatologen eller avdelningen där du fått behandling om du misstänker eller är orolig för eventuella biverkningar.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Ilaris verkar genom att utöva en immunhämmande effekt. De vanligast beskrivna biverkningarna är därför olika former av infektioner. Allvarliga infektioner är ovanliga. Andra ovanliga biverkningar är hudreaktioner vid injektionsstället samt sänkta nivåer av vita blodkroppar och ökade levervärden.

ÖVRIGT

Graviditet och amning: Behandling med Ilaris rekommenderas ej vid graviditet. Kvinnor i fertil ålder skall använda preventivmedel under behandling och i 3 månader efter avslutad behandling.

Kvinnor skall inte amma då de behandlas med Ilaris.

Uppgift saknas för män.

Infektion: Vid behandling med Ilaris kan risken för infektioner öka. Det är därför viktigt att du kontaktar sjukvården om du har en infektion, med eller utan feber, för rådgivning. Misstänker du att du behöver behandling för eventuell infektion kontakta i första hand din Vårdcentral.

Vaccination: Vid behandling med Ilaris skall man undvika vissa typer av vaccin. Kontakta gärna Reumatologen för rådgivning.

Operation: Inga generella rekommendationer finns.

Vid andra sjukvårdskontakter - tala om att Du behandlas/behandlats med Ilaris!

Kontakta reumatologen Sahlgrenska i första hand via e-tjänster på 1177, där kan du ställa frågor om dina läkemedel och begära receptförnyelse.

Logga in på <http://www.1177.se/Tema/E-tjanster> eller ring 031-3422615 för rådgivning.

För aktuella öppettider var god se hemsida: www.sahlgrenska.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på tel 1177, www.1177.se