
ILOMEDIN (iloprosttrometamol)

EFFEKT

Ilomedin används för att förbättra nedsatt blodcirkulation i armar och ben. Denna effekt uppnås genom att vidga små blodkärl vilket gör att blodcirkulationen ökar. Läkemedlet kan användas vid nedsatt cirkulation vid bland annat Sklerodermi/MCTD, SLE med uttalade Raynaudfenomen och vaskulitsjukdomar (blodkärlsinflammationer).

PREPARAT OCH DOSERING

Läkemedlet ges i dropp i 6 timmar. Man inleder droppbehandlingen med en låg dos och ökar sedan dosen successivt upp till maxdos om patienten tolererar det. När behandling startas ger man ofta droppet flera dagar i rad och därefter brukar man ge underhållsbehandling 1–2 dagar per månad.

KONTROLLER

Under det att droppet ges kontrolleras blodtryck regelbundet. Därutöver är det inte nödvändigt med några kontroller.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

De vanliga biverkningarna vid behandling med Ilomedin sammanhänger med påverkan av blodtryckssänkning som medicinen ger upphov till. Dessa biverkningar försvinner snabbt om man sänker dosen på droppet.

De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, illamående, kräkningar, rodnad och värmekänsla i huden och yrsel.

ÖVRIGT

Graviditet och amning

Ilomedin skall inte användas till gravida eller ammande kvinnor. Effektiva preventivmedel ska användas under pågående behandling.

Infektion

Det finns ingen ökad risk för infektioner vid användning av Ilomedin.

Kontakta reumatologen Sahlgrenska i första hand via e-tjänster på 1177, där kan du ställa frågor om dina läkemedel och begära receptförnyelse.

Logga in på <http://www.1177.se/Tema/E-tjanster>
eller ring 031-3422615 för rådgivning.

För aktuella öppettider var god se hemsida: www.sahlgrenska.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på tel 1177, www.1177.se