

Lupus band test/Hudstansbiopsi

Information till dig som ska genomgå en Lupus band test/Hudstansbiopsi

Varför görs undersökningen?

Vid misstanke om sjukdom i huden eller vid vissa reumatiska sjukdomar vill man ibland ta ett vävnadsprov från huden för att skicka på analys.

Hur går undersökningen till?

Vid lupus band test tas prover från solbelyst hud och från icke solbelyst hud.

Först ges lokalbedövning. Därefter tas ett prov från huden med hjälp av en hudstans (rundat skärverktyg 3-4 mm diameter). När provet är taget blodstillar man med järnklorid, som gör såret gulsvart, och ett plåster sätts på.

Såret är så litet att det inte behöver sys. Det tar ett par veckor att läka och du får sedan ett litet ärr på platsen. Om såret inte läker så ska du höra av dig till oss.

Efter undersökningen:

Håll plåstret torrt i två dygn.

Efter två dygn tar du bort plåstret och tvättar såret med tvål och vatten. Klapptorka. Om såret vätskar så sätt på ett nytt luftigt plåster.

Håll såret rent och tvätta med tvål och vatten en gång dagligen tills det läkt.

Undvik bastu och bassängbad till såret läkt.

Infektionstecken:

Det är normalt att såret är rött, svullet och lite ömt de första dagarna. Om det plötsligt skulle börja göra mer ont och bli rödare, varmare och mer svullet så kan en infektion ha uppstått.

Ta i så fall kontakt med oss eller primärvården.

Om du behöver kontakta oss når du oss lättast via e-tjänster på 1177

Eller ring 031-342 26 15