
RITUXIMAB (Ruxience, Truxima, Mabthera, Rixathon)

EFFEKT

Rituximab har en immundämpande effekt genom påverkan på en typ av vita blodkroppar (B-lymfocyter). Används vid reumatoid artrit tillsammans med Metotrexat framför allt hos patienter som inte haft tillräckligt god effekt av så kallade TNF-hämmande läkemedel eller haft biverkningar av dessa. Kan också användas vid vissa andra inflammatoriska systemsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Tid till effekt av läkemedlet varierar mellan veckor till månader hos olika patienter och typ av sjukdom.

PREPARAT OCH DOSERING

Ges som intravenös infusion vid ett eller två tillfällen per behandlings-omgång. Om aktuellt med två tillfällen ges dessa med 14 dagars mellanrum. Behandlingen tar fem till sex timmar. Kan upprepas om behovet föreligger, eller ges med ett fast intervall, till exempel var 6:e månad.

I samband med infusion med Rituximab får man febernedsättande medicin och läkemedel mot allergi. Under behandlingen med Rituximab fortsätter man som vanligt med sina ordinarie mediciner.

KONTROLLER

Blodprover kontrolleras före behandlingen och inför återbesök.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Biverkningar är vanligast i samband med infusion och det kan röra sig om klåda, utslag, feber, lågt blodtryck, yrsel, hjärtklappning, värk i leder och muskler. Sänkt halt av vita blodkroppar och trombocyter kan ses.

Allvarligare biverkningar som infektioner förekommer i enstaka fall.

Neurologiska symtom har uppkommit hos ett fåtal patienter som har behandlats med Rituximab. Det är inte klarlagt om det finns något samband mellan de neurologiska symtomen och Rituximab-behandling. Om du skulle få några neurologiska symtom såsom yrsel, balanssvårigheter, nedsatt kraft eller känsel i någon kroppsdel tex ben är det viktigt att du kontaktar Reumatologen så snart som möjligt.

ÖVRIGT

Graviditet och amning: Kvinnor skall använda effektiva preventivmedel under behandling och i 6 månader efter avslutad behandling med Rituximab. Undantag kan göras vid mycket allvarlig sjukdom som kräver behandling.

Kunskapsläget för män är begränsat.

Om uttalat behov av behandling med Rituximab kan denna ges till män inför planerad graviditet hos partner.

Rituximab används endast i undantagsfall under amning och då i samråd med barnläkare.

Vaccination: Rituximab påverkar effekten av vaccin, så om man skall vaccinera sig måste man göra det 4 veckor innan behandlingen, eller tidigast 6 månader efter behandlingen, detta gäller även för vaccin mot SARS-CoV-2 (covid-19). Vissa vaccin är olämpliga att ta vid behandling med Rituximab, rådfråga gärna läkare eller sjuksköterska på reumatologmottagningen.

Infektion: Vid behandling med Rituximab kan risken för infektioner öka. Om du får tecken på infektion, exempelvis hög feber, hosta, urinvägsbesvär eller oklara buksmärter, så är det viktigt att du hör av dig till sjukvården för bedömning om antibiotikabehandling är nödvändig.

Studier tyder också på att behandling med rituximab kan öka risken för långvarig eller svårare **covid-19**, samt sämre effekt av vaccin.

Vid symptom på covid-19 så är det därför viktigt att du skyndsamt testar dig med ett antigen test (egentest som du köper på apoteket).

Vi rekommenderar dig därför att alltid ha ett **antigen test** hemma så att du snabbt kan ta detta prov.

Testar du positivt ska du omgående kontakta oss på Reumatologen dagtid (vardagar på tel. 031-342 26 15, helger på tel. 031- 342 11 15).

Är antigen testet negativt men du dagen efter fortsatt har symptom talandes för covid-19 infektion kan du ta ytterligare ett antigen test. Om positivt kontakta oss enligt ovan.

Av oss kommer du få information om det kan vara aktuellt med så kallad antiviral medicin mot covid-19. Denna behandling kan ges både som tablett och dropp.

Medicinen har visat sig minska risken för svår covid-19 sjukdom.

Operation: Planerad operation förläggs helst så långt efter behandling med Rituximab som möjligt. Minst 4 månader efter.

Vid andra sjukvårdskontakter - tala om att Du behandlas/behandlats med Rituximab!

Kontakta reumatologen Sahlgrenska i första hand via e-tjänster på 1177, där kan du ställa frågor om dina läkemedel och begära receptförnyelse.

Logga in på <http://www.1177.se/Tema/E-tjanster>
eller ring 031-3422615 för rådgivning.

För aktuella öppettider var god se hemsida: www.sahlgrenska.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på tel 1177, www.1177.se