

ORENCIA (Abatacept)

EFFEKT

Orencia är ett läkemedel som motverkar aktivering av en sorts vita blodkroppar, sk T-lymfocyter, som är av betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom. Orencia används vanligtvis som behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit) eller psoriasisartrit. Oftast används Orencia tillsammans med Metotrexat.

PREPARAT OCH DOSERING

Orencia 125 mg ges subkutant (under huden) 1 gång/vecka. Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C), får inte frysas, ljuskänsligt. Läs bipacksedeln för mer information.

Om dosen är försenad mindre än eller lika med 3 dagar ska man injicera den glömda dosen och följa ursprungsschemat. Om dosen är försenad mer än 3 dagar kontakta läkare eller sjuksköterska.

En instruktion för hantering av pennan/sprutan finns på www.fass.se: Sök på Orencia, längst ned på sidan finns en skriftlig instruktion för användning av pennan/sprutan. På www.medicininstruktioner.se hittas en instruktionsfilm för hantering.

Orencia kan också ges i dropp av sjuksköterska. Efter den inledande behandlingen ges Orencia 2 och 4 veckor efter första droppet och sedan var fjärde vecka. Olika doser ges beroende på kroppsvikten. Behandlingen tar mellan 1,5–2,5 timmar

KONTROLLER

Blodprover kontrolleras efter 3 månaders behandling och därefter var 3:e månad. Vid behandling med dropp kontrolleras blodprover i samband med varje behandling de första 6 månaderna, härefter var 3:e månad. Är proverna bra hör du inget från oss. Det är viktigt att du tar prover regelbundet som du ordinerats för att vi skall kunna upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Om du själv misstänker biverkningar av medicinen kontakta Reumatologen.

Effekten av behandlingen utvärderas första gången efter 4–6 månader. Om det visar sig att man har god effekt av Orencia fortsätter man behandlingen. Om effekten är tveksam avslutar man behandlingen och får välja ett annat behandlingsalternativ.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

De flesta biverkningarna är milda eller måttliga.

Huvudvärk, illamående, blodtrycksökning, förhöjda levervärden, ostadighetskänsla, hosta, buksmärtor, diarré, utslag, nedre och övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektion, herpessimplex, trötthet, högt blodtryck, ansiktsrodnad, olika typer av blodbildspåverkan.

Reaktioner på injektionsstället (klåda, blåmärken, rodnad) är vanligt, men är ofarligt och oftast övergående.

Reaktioner i samband med droppet kan förekomma såsom yrsel, huvudvärk och högt blodtryck. Allergiska reaktioner är ovanliga.

Eventuella biverkningar försvinner om behandlingen avslutas.

Det är okänt om Orenca kan öka risken för tumörer på lång sikt, men hittills finns inget som tyder på detta.

ÖVRIGT

Graviditet och amning: Avsluta behandlingen vid påvisad graviditet. Uppgift saknas för män. Avstå amning under behandling med Orenca.

Operation: Inför planerad operation bör man göra uppehåll med den subkutana behandlingen i minst 1 vecka innan och droppbehandlingen i minst 4 veckor innan. Behandlingen kan som regel återupptas 1-2 veckor efter operationen, om inga komplikationer tillstött.

Infektion: Om du har en infektion och/eller feber när du ska ta din Orenca är det lämpligt att du gör uppehåll fram tills du är frisk, ring gärna oss för rådgivning. Kontakta din Vårdcentral i första hand om du misstänker att du behöver behandling för din infektion.

Vaccin: Vid behandling med en del anti-reumatiska läkemedel skall man undvika vissa typer av vaccin. Kontakta gärna Reumatologen för rådgivning

Vid andra sjukvårdskontakter – tala om att du behandlas med Orenca!

Kontakta reumatologen Sahlgrenska i första hand via e-tjänster på 1177, där kan du ställa frågor om dina läkemedel och begära receptförnyelse.

Logga in på <http://www.1177.se/Tema/E-tjanster>
eller ring 031-3422615 för rådgivning.

För aktuella öppettider var god se hemsida: www.sahlgrenska.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på tel 1177, www.1177.se