

Tocilizumab (Tyenne, RoActemra)

EFFEKT

Tocilizumab innehåller ett ämne som hämmar effekten av ett särskilt äggviteämne/protein som heter interleukin-6. Detta protein deltar i inflammatoriska processer i kroppen och genom att hämma proteinet kan inflammationen i din kropp minskas. Tocilizumab används framför allt för att behandla vuxna med ledgångsreumatism/reumatoid artrit (RA) om tidigare behandlingar inte fungerat tillräckligt bra. Tocilizumab ges då vanligtvis i kombination med Metotrexat. Tocilizumab kan även ges vid temporaliserit

DOSERING och FÖRVARING

Tocilizumab ges i dropp av sjuksköterska var fjärde vecka, eller tas av patienten själv som en subkutan (under huden) injektion en gång per vecka. Sprutorna/pennorna skall förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas.

En instruktion för hantering av sprutan/pennan finns på www.fass.se: Sök på Tyenne alt. RoActemra (välj den du fått förskrivit). Längst ned på sidan finns en skriftlig instruktion för användning av sprutan/pennan, och i vänsterspalten under "Tips för användning" finns en instruktionsfilm.

KONTROLLER

Blodprover kontrolleras regelbundet 1 gång/månad de första 6 mån, därefter var 3:e månad, om inte din läkare eller sjuksköterska meddelar annat.

Vid behandling med dropp kontrolleras prover enligt ett särskilt schema. Innan behandlingen startas och vid provtagningen efter tre månader tas även blodfetter.

Är proverna bra hör du inget från oss. Det är viktigt att du tar prover regelbundet som du ordinerats för att vi skall kunna upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Om du själv misstänker biverkningar av medicinen kontakta Reumatologen.

Effekten av behandlingen utvärderas första gången efter 3–6 månader. Om det visar sig att man har god effekt av Tocilizumab fortsätter man behandlingen. Om effekten är tveksam avslutar man behandlingen och får välja ett annat behandlingsalternativ.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

De flesta biverkningarna är milda eller måttliga. Biverkningar som rapporterats är bland annat:

Övre och nedre luftvägsinfektioner, herpessimplex (mun), bältros, hudinfektion, munsår, magont, utslag, klåda, huvudvärk, yrsel, förhöjda levervärden,

blodtrycksförhöjning, minskning av vita blodkroppar, uppgång av blodfetter, ögoninflammation

Reaktioner i samband med droppet kan förekomma såsom yrsel, huvudvärk och högt blodtryck. Allergiska reaktioner är ovanliga.

Det är okänt om Tocilizumab kan öka risken för tumörer på lång sikt, men hittills finns inget som tyder på detta.

ÖVRIGT

Graviditet och amning: Behandlingen avslutas vid påvisad graviditet. Avstå amning under behandling med Tocilizumab. Uppgifter saknas för män.

Operation: Inför planerad operation bör man göra uppehåll med den subkutana behandlingen i minst 1 vecka och droppbehandlingen i minst 4 veckor. Behandlingen kan som regel återupptas 1-2 veckor efter operationen om inga komplikationer tillstött.

Infektion: Vid behandling med Tocilizumab kan risken för infektioner öka. Om du får tecken på infektion, exempelvis hög feber, hosta, urinvägsbesvär eller oklara buksmärtor, så är det viktigt att du skyndsamt hör av dig till sjukvården för bedömning om antibiotikabehandling är nödvändig. Behandling med Tocilizumab kan dämpa den normala feberreaktionen vid en infektion och även sänka nivåerna av inflammationsmarkörer (sänka och CRP) i blodet. Därför är det viktigt att informera vårdgivare om din behandling med Tocilizumab vid misstanke om en pågående infektion. Vid en infektion bör du göra uppehåll med Tocilizumab tills du tillfrisknat och avslutat eventuell antibiotikabehandling. Kontakta gärna reumatologmottagningen för rådgivning.

Vaccin: Vid behandlingar med en del anti-reumatiska läkemedel skall man undvika vissa typer av vaccin. Kontakta gärna reumatologmottagningen för rådgivning.

Vid andra sjukvårdskontakter – tala om att du behandlas med RoActemra!

Kontakta reumatologen Sahlgrenska i första hand via e-tjänster på 1177, där kan du ställa frågor om dina läkemedel och begära receptförnyelse.

Logga in på <http://www.1177.se/Tema/E-tjanster> eller ring 031-3422615 för rådgivning.

För aktuella öppettider var god se hemsida: www.sahlgrenska.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på tel 1177, www.1177.se