

SIMPONI (Golimumab)

EFFEKT

Simponi är ett läkemedel som hämmar TNF (tumor necrosis factor), vilket är ett cytokin (= signalsubstans) som bidrar till många av symtomen vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Effekten som oftast är mycket påtaglig kommer redan efter några veckors behandling och symtom som smärta, stelhet, ledsvullnad och trötthet minskar.

I första hand är medlen avsedda för patienter som haft otillräcklig effekt eller biverkningar av andra antireumatiska mediciner och har en hög sjukdomsaktivitet.

Oftast kombineras TNF - hämmare med andra långverkande antireumatiska mediciner

DOSERING och FÖRVARING

Simponi 50 mg tas subkutant (under huden) samma datum varje månad.

* Om dosen är försenad mindre än 2 veckor kan du injicera den glömda dosen och hålla dig till det ursprungliga månadsschemat.

* Om dosen är försenad mer än 2 veckor ska du injicera den glömda dosen och ett nytt månadsschema ska gälla från datumet för denna injektion.

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C), får inte frysas, ljuskänsligt förvaras i originalförpackning. Kan förvaras i rumstemperatur under en enstaka period i högst 30 dagar inför att sprutan ska användas. Läs bipacksedeln för mer information.

KONTROLLER

Blodprover kontrolleras regelbundet 1 månad och 3 månader efter uppstart och sedan var 6:e månad, om inte din läkare eller sjuksköterska meddelar annat. Är proverna bra hör du inget från oss.

Det är viktigt att du tar prover regelbundet som du ordinerats för att vi skall kunna upptäcka eventuella biverkningar och i vissa fall avbryta behandlingen. Om du själv misstänker biverkningar av medicinen kontakta Reumatologen.

Effekten av behandlingen utvärderas första gången efter ca 4 månader. Om effekt uteblivit sätts medicinen ut.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Du kan få rodnad, klåda eller ömhet i huden vid injektionsstället, men det är ofarligt. Oftast försvinner det efter några dagar. Du kan köpa receptfri kortisonsalva på apoteket för att lindra rodnad och klåda. Eftersom golimumab påverkar immunförsvaret kan man bli mer mottaglig för infektioner som förkylningar, urinvägsinfektioner och luftvägsinfektioner. Levervärden och blodvärden kan påverkas.

ÖVRIGT

Graviditet och amning: Vid tydligt behov kan behandling med Simponi fortgå men avslutas vanligen före graviditetsvecka 20 om stabil sjukdom. Under behandling med Simponi kan man överväga att amma. Förutsatt att barnet är friskt och inte för tidigt född är Simponi sannolikt ofarligt för barnet.

Det görs alltid en individuell bedömning via barnläkare/BVC inför vaccination med levande försvagade vaccin till barn vars mödrar behandlats med Simponi från graviditetsvecka 20 och framåt och/eller under amning.

Vid Simponi rekommenderas vanligen att levande försvagade vaccin ges som tidigast vid sex månaders ålder (vid exponering från graviditetsvecka 20 och framåt). Vid exponering enbart via amning rekommenderas vanligen att ge levande försvagade vaccin till barnet som tidigast sex månader efter avslutad amning.

Män kan fortsätta med behandlingen vid planerad graviditet.

Operation: Planerad operation bör förläggas minst 4 veckor efter sista injektionen, och kan som regel återupptas 1–2 veckor efter operation om inga komplikationer tillstött.

Infektion: TNF har betydelse för immunsystemet och därmed försvaret mot infektioner. Vid behandling med TNF - hämmare har man sett en ökad risk för lättare infektioner som förkylningar och urinvägsinfektioner men även allvarligare infektioner som tuberkulos. Om du har en infektion och/eller feber när du ska ta din Simponi-spruta är det lämpligt att du gör uppehåll fram tills du är frisk, ring gärna oss för rådgivning. Kontakta din Vårdcentral i första hand om du misstänker att du behöver behandling för din infektion.

Vaccin: Vid behandling med TNF-hämmare skall man undvika vissa typer av vaccin. Kontakta gärna Reumatologen för rådgivning.

Vid andra sjukvårdskontakter – tala om att du behandlas med Simponi!

Kontakta reumatologen Sahlgrenska i första hand via e-tjänster på 1177, där kan du ställa frågor om dina läkemedel och begära receptförnyelse.

Logga in på <http://www.1177.se/Tema/E-tjanster>
eller ring 031-3422615 för rådgivning.

För aktuella öppettider var god se hemsida: www.sahlgrenska.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på tel 1177, www.1177.se