

Skyrizi (Risankizumab)

EFFEKT

Skyrizi har en immundämpande effekt genom hämning av en viss signalsubstans (IL- 23), som har betydelse för inflammation. Preparatet tillhör gruppen av så kallade biologiska läkemedel. Skyrizi kan användas vid psoriasisartrit (och psoriasis) om inte behandling med andra antireumatiska läkemedel har haft tillräckligt god effekt. Skyrizi kan ges ensamt eller i kombination med Metotrexat. Behandlingseffekt noteras vanligen inom 3–4 månader och utvärderas vid läkarbesök efter cirka 6 månader.

PREPARAT OCH DOSERING

Skyrizi ges som en subkutan (under huden) injektion. I början ges två behandlingar med 4 veckors intervall, därefter ges behandlingen var 12:e vecka. Injektionen ges av sjuksköterska på reumatologens behandlingsenhet (Inflammationscentrum). Under behandlingen med Skyrizi fortsätter man som vanligt med sina ordinarie mediciner. Räkna med att hela behandlingen/besöket tar ungefär 1 timme.

KONTROLLER

Blodprover kontrolleras inför att behandlingen påbörjas samt var 4:e vecka under de tre första månaderna.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Biverkningar är vanligast i samband med injektionen och rör sig då oftast om allergiska reaktioner lokalt vid injektionsstället. Generella allergiska reaktioner kan också förekomma. Behandlingen kan ge ökad risk för infektioner och vidare anges huvudvärk som vanlig biverkning.

ÖVRIGT

Graviditet och amning: Kvinnor skall använda effektivt preventivmedel under behandling med Skyrizi och minst 21 veckor efter avslutad behandling med läkemedlet.

Uppgift saknas för män. Kvinnor bör ej amma under pågående behandling med Skyrizi.

Infektioner: Vid behandling med Skyrizi kan risken för infektioner öka. Kontakta din vårdcentral om du misstänker att du behöver behandling för en infektion. Kontakta gärna reumatologen för rådgivning.

Om du har en pågående infektion vid tidpunkten för din behandling, kontakta Inflammationscentrum för att skjuta fram denna tills du tillfrisknat.

Operation: I normalfallet bör det gå 12 veckor mellan senaste injektion av Skyrizi och en planerad operation. Behandlingen kan sedan återupptas 2 veckor efter operationen.

Vaccin: Vid behandling med Skyrizi skall man undvika vissa typer av vaccin. Kontakta gärna Reumatologen för rådgivning.

Vid andra sjukvårdskontakter – tala om att du behandlas med Skyrizi!

Kontakta reumatologen Sahlgrenska i första hand via e-tjänster på 1177, där kan du ställa frågor om dina läkemedel och begära receptförnyelse.

Logga in på <http://www.1177.se/Tema/E-tjanster> eller ring 031-3422615 för rådgivning.

För aktuella öppettider var god se hemsida: www.sahlgrenska.se

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på tel 1177, www.1177.se