
Information om kavitetsundersökning

Det är viktigt att du är blödningsfri vid besöket och att det är före ägglossning. Om din menscykel har förändrats och inte stämmer enligt tidigare inkomna uppgifter, vänligen kontakta oss via 1177 eller 031-342 39 19 knappval 2.

Måndag-torsdag 09.30-12.00

Fredag 10.00–12.00.

Förberedelser inför kavitetsundersökning, s.k. KAVUS

Du behöver inte vara fastande inför undersökningen.

En timma innan planerad undersökning tar du 2 tabletter Panodil à 500 mg eller 1 tablett Ipren 400mg. Medicinen köper du själv.

OBS! Om du är allergisk mot NSAID eller har astmabesvär, ta tabletter Panodil.

Hur går undersökningen till?

Undersökningen går till så att en tunn plastkateter förs in i livmoderhalsen. Via katetern spoleras med koksalt för att bedöma livmoderns insida. Bedömningen av hur det ser ut i livmodern görs under tiden med hjälp av ultraljud via slidan.

Själva undersökningen tar ca 10 minuter, men ibland behöver man vila en stund efteråt eller planera för vidare utredning. Avsätt ca en timma för besöket.

Efter undersökningen

För att motverka infektion skall du undvika samlag, bad och tampong samma dag som du har gjort undersökningen.

Om du efteråt får feber, smärta eller andra besvär kontakta barnmorska på 031-342 39 19, måndag-fredag kl. 07.30-14.30. Välj alternativ ”rådgivning”.

Reproduktionsmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset