

Lumbalpunktion/Ryggvätskeprov på Minnesmottagningen

Detta prov är en viktig del i utredningen. Vid till exempel Alzheimers sjukdom kommer sjukdomsprocesser i hjärnan att kunna avspeglas vid analyser utav hjärnvätskan. Andra tillstånd kan uteslutas med denna undersökning.

Förberedelser

Undersökningen kräver inga förberedelser. Du kan äta frukost och ta dina mediciner som vanligt.

Kontakta genast Minnesmottagningen om du:

Äter blodförtunnande läkemedel som till exempel Eliquis, Waran eller Clopidogrel.
Äter smärtstillande läkemedel regelbundet så som Treo eller Ipren.
Nyligen blivit insatt på nytt läkemedel.

Hur går undersökningen till?

Provtagningen utförs i nedre delen av ländryggen. Provet tas från ryggvätskekanalen. En liten mängd vätska tappas ut vis en tunn nål. Vätskan som tappas ut nybildas snabbt igen. Oftast ges lokalbedövning.

Efter undersökningen

Vi rekommenderar inga tunga lyst eller fysiska aktiviteter på 1–2 dagar efter undersökningen. Drink gärna koffeinhaltiga drycker. De flesta mår bra efter undersökningen. En del kan få huvudvärk efter undersökningen och då är det allra bästa att lägga sig plant på rygg. Man kan också ta smärtlindrande läkemedel som till exempel Alvedon eller Panodil.

Komplikationer

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter ett ryggvätskeprov. Uppsök vård om du får feber utan tydlig orsak, svaghet eller känselnedsättning i benen.