

Information om cystometri

Cystometri

Undersökningen görs för att få information om urinblåsans funktion. Man kan bland annat bedöma om blåsan är överaktiv eller om det finns något avflödeshinder (t ex förstorad prostata) för urinen.

Så här går det till

En tunn plastkateter med bedövningsgel på förs in i urinblåsan. Genom katetern fylls blåsan med koksaltlösning samtidigt som trycket i blåsan mäts. Via en tunn kateter i ändtarmen mäts buktrycket. Under undersökningen registreras olika grader av trängningar till vattenkastning. När blåsan känns full avbryts vätskepåfyllningen och du får kissa i en flödesmätare. I vissa fall behöver undersökningen kompletteras med en tryckmätning i urinröret eller mätning av slutmuskeln funktion.

Undersökningen tar normalt 30 – 60 minuter.

Förberedelser

1. Tar du något läkemedel som är blåslugnande skall du göra uppehåll med medicinen en vecka innan undersökningen. Vid osäkerhet kontakta oss på telefon, se nedan.
2. Har du en ryggmärgsskada tar du eventuella mediciner som vanligt.
3. Tar du blodförtunnande medicin behöver den inte sättas ut inför undersökningen.

Efter undersökningen

Sveda i urinröret när du kissar och lite blodtillblandad urin under något dygn är inte ovanligt. För att minska svedan och "skölja" urinvägarna är det bra att dricka lite extra.

Komplikationer

I sällsynta fall kan man få en urinvägsinfektion efter cystometrin. Svår sveda, täta trängningar och feber är tecken på infektion. Kontakta i första hand oss på telefon: 031-342 68 22 kl 11.30 – 12.00, eller din vårdcentral eller Akutmottagningen.