

Dilatation av förträngning i urinledaren via Intervention

Vid hinder i urinledaren kan detta efter en tid medföra att njurfunktionen försämras. För att åtgärda förträngningen behöver urinledaren vidgas. För att bibehålla resultatet av vidgningen behöver vi lägga in en inre splint som du kommer att ha kvar under en begränsad tid.

Förberedelser inför undersökningen

- Du ska genomföra en dubbeldusch med bakteriedödande klorhexidintvål (Descutan) på morgonen besöksdagen eller på kvällen innan. Descutan finns att köpa receptfritt på Apoteket.
- Du ska vara fastande (inte äta eller dricka något) innan besöket, se meddelande i kallelsen om när fastan startar.
- OBS: Om du använder någon blodförtunnande medicin ska du kontakta oss snarast!
- Lämna smycken, piercing, klocka mm hemma.
- Avlägsna nagellack om du använder det.
- Innan ingreppet ska du lämna blodprov. Du kan lämna tidigast 24h och senast 2h innan du kommer till mottagningen. OBS endast på våra sjukhus, EJ vårdcentral. Se separat info om hur du bokar tid för provtagning.

Undersökningsdagen

- Ta dina ordinarie mediciner, ej blodförtunnande, före undersökningen. Ta med dina mediciner till mottagningen om det är några du tar under dagen.
- Kom till urologmottagningen enligt datum och klockslag på kallelsen.
- Du kommer att få byta om till operationsskjorta och åka brits/säng till undersökningsrummet.
- Du kommer att få antibiotika och smärtstillande i förebyggande syfte.
- Du kommer att få ett ID-band runt handleden.
- Du får en nål (PVK) i armen ifall du behöver något läkemedel.

- När ingreppet är klart kommer du tillbaka till urologmottagningen där vi kontrollerar att allt gått bra.
- Du kommer att få muntlig information om din inre splint.
- Innan du går hem tar vi bort ID-bandet och nålen (PVK) i armen.

Kontakt

Sjuksköterskerådgivningen på tel. 031-342 11 70 eller via 1177.se