

Inför kataraktoperation

Vad innebär katarakt?

Katarakt eller gråstarr innebär att ögats lins grumlas. Synförmågan försämras gradvis i och med att linsen blir mer ogenomskinlig.

Före operationen görs en noggrann undersökning. Då beslutas om operation behöver genomföras. Ögat undersöks oftast med både ultraljud och mikroskop. Om du använder kontaktlinser skall hårda linser ej användas 3 veckor före undersökningen. Om du använder mjuka skall du vara utan 3 dagar.

Operation av katarakt

Den enda behandlingsmetoden är operation. Ett litet snitt läggs i ögat och den grumlade linsen avlägsnas och ersätts sedan av en konstgjord lins. Operationen sker i allmänhet under lokalbedövning i form av ögondroppar.

Finns det risker?

Kataraktoperation är ett standardingrepp som i de allra flesta fall ger förbättrad syn. Man ska dock komma ihåg att inga operativa ingrepp är helt riskfria. Allvarliga komplikationer som kan försämra synen kan inträffa men är mycket ovanliga.

Kontroller

Behovet av kontroller är individuellt. I de flesta fall undersöks ögat cirka en till tre veckor efter operationen. Tiden för detta besök ges före hemgång på operationsdagen. Den egna linsens tunna kapsel lämnas kvar i ögat vid operationen. Efter en tid, månader eller år, kan grumlingar på denna linskapsel uppstå. Är den synpåverkande och kan detta behandlas med laser.

I de flesta fall behövs någon form av glasögon som komplement till den inopererade linsen. Dessa kan provas ut hos optiker cirka 6 veckor efter operationen. Vissa patienter klarar sig med att köpa ett par enkla, färdiga läsglasögon.

Speciallinser

Den offentligt finansierade ögonsjukvården i Västra Götaland tillhandahåller tills vidare inte multifokala, eller ackommoderande linser. Önskas en sådan linsprotes var god ta kontakt med privat ögonkirurg.