

Inför behandling med botulinumtoxin

Du har blivit kallad till Hyperhidros-mottagningen som är lokaliserad vid Hudmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid besöket kommer du att träffa läkare och sjuksköterska för att diskutera dina besvär och vilken behandling som kan lämpa sig i ditt fall. Skulle du bedömas vara lämplig för injektionsbehandling vill vi informera dig om att denna behandling kan vara smärtsam.

Tänk på:

- Injektionsbehandling med botulinumtoxin ges ej till gravida eller ammande.
- Om du får botulinumtoxin på en annan indikation (till exempel neurologi eller kosmetik) måste du informera din läkare/sjuksköterska. Detta för att undvika risker för överdosering eller utveckling av antikroppar. Det måste gå minst 12 veckor mellan varje behandling oavsett indikation.

Det du ska tänka på inför besöket

- Om du ska behandla **armhålor** ska du ha rakat dina armhålor senast 2–3 dagar innan besöket. Det går även att köpa Emla/Tapin (bedövningskräm) receptfri på apoteket som kan smörjas i armhålorna cirka 1 timme innan behandlingen.
- Om du ska behandla **händer** används i första hand is som lokalbedövning. Men i vissa fall ges en nervblockad.
- För att få så god smärtlindring som möjligt, vid eventuell behandling, kan det vara bra att ta 1 gram Panodil en timme innan besöket.

Så går behandlingen till

Vi tvättar först dina armhålor och/eller händer med desinfektionsmedel, därefter injiceras botulinumtoxin med en liten spruta på flera ställen i armhålorna/handflatorna.

För bästa effekt av behandlingen ska du undvika sol och värme samt att träna 48 timmar efter injektionerna.

Om det är något du undrar över får du gärna kontakta oss via 1177 eller ringa på telefonnumret som finns på kallelsen.