

Senast reviderat:

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Pia Abrahamsson Op. ssk (piaab)

Laparoskopisk rektumamputation

Op.kort	JGB31
Op.bord	Standardbord med bensärplattor PinkPad-madrass dubbla benremmar (Byte till stövlar om patienten <u>inte</u> skall vändas)
Op.galler	Laparoskopigaller, MIS extra instrument optik 30° Rektalgaller
Sterilklädsel	Lap.skopiset op 1-8 Lap.skopiset Abdo-perianal
Före op.start	Direkt efter sövning (innan steriltvätt): RING OPERATÖREN. Descutantvätta för katetersättning ner i ljumskarna och på låren, vänd på sidan, tvätta rumpan stort och avsluta med att tvätta anus. Kirurgen spritar med klorhexidin 5 mg/ml och anus sluts med 2-0 PDS CT1 + och spritar igen efter. Det går bra att ta steril sax, pincett och nålförare från Rektaltillsatsen alt. engångs suturset. Opereras en man så sätts en Hematurikateter nr 18 av kirurgen. På kvinnor sätter vi en tempkateter nr 12. Kvinnor vaginaltvättas med klorhexidinlösning 1 mg/ml innan sterilklädsel.
Extra instrument	Lamphandtag Monopolär diatermi Harmonic HAR1136 Troakar 2B12LT Ethicon 1 st

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

	Hylsa CB12LT Ethicon 1-2 st Troakar 2B5LT Ethicon 1 st Hylsa CB5LT Ethicon 1 st Tarmtänger MIS 2 st S-hakar Ev. Veresskanyl Ev. Ligaclip ER420 Ev. Echelon flexstaple 60 + Magasin Ev. TLC75 + magasin
Läkemedel och vätskor	Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml + 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml Plasmalyte 1000 ml
Suturer	Biosyn 4-0 Cv25 PDS 2-0 CTI PDS 2-0 UR -6 Monosof 2-0 C-17
Övrigt:	Kameraskydd Insufflatorslang Antitag alt. Clearify Sug-spol Lamphandtag Bruna dukar Gula tork Drevac drän 18 ch med passiv påse
Op.drapering	Från xiphoideus till symfys
Speciella önskemål	Upplägg A Hö. arm in Skopistapel fotända vä. sida Innan bukdel av operationen avslutas lämnas en duk kvar i lilla bäckenet. Op.såret försluts och stomin sys. Förband läggs innan patienten vänds till bukläge. Vg. se PM för vändning. OBS! Polstra runt stomin innan vändning, gäller även dränage