

Senast reviderat: 2021-09-29

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Pia Abrahamsson, Operationssjuksköterska (piaab)

## Metodkort Laparoscopisk op av endometriosis

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op kort:	LBC11
Op bord:	Benstöd
Op galler/hakar:	SCOPIBOX GYN
Extra instrument:	Knivblad nr 15 0° Optik Sug engångs <b>KSM26</b>  Likadan ”grundframplockning ” som till övriga laparoscopier på Kirurgoperation.
Övrigt:	Kateter sätts sterilt av gynekolog
Läkemedel & Vätskor	Varm Ringer-Acetat (finns i värmeskåp i Sakristian) Klorhexidinlösning Marcaïn 0,5 % (till portar vid avslutande av operationen)
Op drapering:	Laparoscopiskt gynset “allt i ett”.

**Postadress:**

Ange verksamhet  
Ange avdelning/enhet  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 10 00

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

Speciella önskemål	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Drapera patienten</li><li>2. Rullbord dukas för vaginaltvätt och kateterinsättning</li><li>3. Ge dubbla handskar till gynekolog</li><li>4. Gynekolog vaginaltvättar och sätter kateter</li><li>5. Gynekolog sätter fast hulkatång i uterus. Tyngder hängs på terilt av den som passar på salen (finns i skåp sal 5).</li></ol>
Op teknik:	<p>Fyller buken med gas på sedvanligt sätt. För in arbetstroakar och visualisera lilla bäckenet. Uterus bjuder sig liten. Ett normalt vänster adnex. På höger sida är ovariet uppdrivet i en slät cirka 6 centimeterstor cysta. I fossa Douglasi och kring sacro uterin ligamentum ses en utsådd av endometrioslignande förändring. Arbetar i tänkt lågt Pfannensteilsnitt med 6 millimeters ingångsportar. Börjar med att tömma cystan genom att föra in 5 millimeters port och troakar kring cystan och därefter suga ut chokladliknande innehåll. Därefter exstirperas cystan genom ett utvidgat snitt, där man finner lagret mellan cystkapsel och ovarium. Bipolär diatermi i botten. Därefter utförskaffas i ett utvidgat medellinjessnitt, där man fört in 11-troakar och tar ut preparatet med skedtång. Syr sedan fascia med enstaka suturer. Enstaka Monosof i huden.</p> <p>/Spec läk Marie Ellerström.</p>