

Senast reviderat: 2025-12-18

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operations 1 och 8

Innehållsansvarig: Helen Jansson, Operationssjuksköterska (helje13)

Metodkort Carotis – subclavia bypass

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	LITET GALLER KÄRLGALLER SMÅTT&GOTT-GALLER
Op bord:	Standardoperationsbord alt. lång kolfibertopp
Extra instrument:	Smala och djupa Langenbeck Ev Cone hake, 2 st Ringpincett Epitome diakniv X-fin DeBakey pincett 21 cm Beaver knivblad Fogarthyclämmare med insert 33 mm

Övrigt:	Material: Tryckmätningsslang + grön i v kanyl Vessel loops blå + vit Monopolärt diatermihandtag Kardborreband, Grön kanyl med oliv (engångsspets) KAD Flödesprobe Ev. Steridrape 1000 Ha alltid en carotisshunt på salen.	Apparatur: Ev Flödesmätare Ev Doppler
Läkemedel & Vätskor	Heparin/Koksalt enligt PM. (5000 IE Heparin i 500 ml NaCl)	
Suturer:	0-0 Ti-Cron ligatur 4-0 Ti-Cron ligatur 6-0 kärlsutur 3-0 Monocryl PS-1 4-0 Monocryl PS-2	
Uppläggning:	Gelring, ryggläge. Huvudet lätt bakåtböjt och något roterat bort från den sjuka sidan. Armen på den sjuka sidan läggs utmed kroppen. Örsnibb frikläs. Snitt 1 cm proximalt ovan clavikeln. Man gör en bypass från arteria carotis communis till subclavia. Nästan alltid vänster sida. Se upplägg Metodkort carotis.	