

Senast reviderat: 2021-09-29

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Pia Abrahamsson, Operationssjuksköterska (piaab)

Metodkort Cystektomi + ortopt blåssubstitut (Studer isoperstaltisk slynga)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	KCC000	
Op galler/hakar:	LAPAROTOMIGALLER, EV KIRCHNERHAKE, EV MAXIGALLER	
Extra instrument:	Gil Vernet, 2 st Myggor, 5 st (ev) Babcock, 5 st Gallgrind Pott sax, 18 cm Diaförlängare Barre 28 cm (Hugosson) Harrington (Holmäng) LigaSure Impact KSG383 (TLC55) KSÖ53 (TCR55) KSÖ12 Surgiclip AutoSuture L KSÖ161	Fransyskor, 5 st (ev) Knivblad nr 15 (Hugosson nr 10 på långt skaft) Lloyd Davis (ev) Wickström Mätsticka Collinhake (ev)

Övrigt:	Disarp IOBAN Foleykateter nr 20 Babyfeeding 2 st (fråga storlek) + 2 st connektorer Foley Siliconkateter 22 Ch Sugkateter nr 16 (Orange) Spruta 60 ml Svarta tork (Holmäng) } Breisky hake + X-tång } Från KK (Holmäng) Rehns hake platt }	Suturboots Vessel loops, 1 pkt
Suturer:	2-0 Polysorb ligaturer, långa 4-0 Vicryl Rapid SH-1 4-0 Monocryl JB-1 3-0 Polysorb V-20 2-0 Polysorb GU 45 2-0 Polysorb GU 46 2-0 Monocryl UR-6 x 2 2-0 Polysorb V-20 eller Monocryl JB 2-0 Ti-cron CV-305 2-0 Ståltråd FSLX (ev)	att sy fast babyfeeding uretärplattan blåssubstitut, dubbelradig dorsala venkomplexet dorsala venkomplexet anastomossutur blåssubstitut, enkelradig att fästa

		uretärkat Foley 22 Ch
Uppläggning:	Ryggläge, bockat läge på män. (var god se metodkort radikal prostata)	
Op drapering:	Steriltvätta hela buken, penis + scrotum samt sätt kateter sterilt	
Preparathantering:	Vid cystektomi ska urinblåsan fyllas med formalin (ska ej längre klippas upp).	
Speciella önskemål:	OBS! Om patienten är hysterectomerad sätts ett Risslerhandtag in i vaginan. Kan sättas in från början. (Fråga kirurgen). Om man sätter in handtaget från början måste det fixeras med tejp på låret annars glider det ut. Blöja under patienten eftersom det kan blöda lite från vaginan under operationen.	