

**Transplantationscentrum**  
 Avdelning 139

Senast reviderat: 2026-05-11  
 Dokumentet gäller för: Transplantationscentrum, avdelning 139  
 Innehållsansvarig: Entela Bollano, Läkare Kardiologi

# Hjärtbiopsi på hjärttransplanterad patient, checklista

**Patient ID:**

Förberedelser	Datum	Signatur	Anmärkning
Informera patient			
Överkänslig? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, mot:			
Sekretess? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja			
PK om patienten står på Waran			
Blodtryck, puls, temp, SaO2 - NEWS			
PVK endast vid behov av lugnande i.v. på kardiologlab			
Om patienten har CVK/CDK i V. Jugularis höger skickas ny CVK/CDK med till kardiologlab om fortsatt behov av infart finns			
<b>Undersökningdagen</b>			
Inga blodprover tas på biopsidagens morgon, eventuella blodprover tas på kardiologlab			
Fast föda fram till fyra timmar innan us  Klara drycker fram till två timmar innan us			
Total fasta två timmar innan us. Patienten ska inte ta morgonmediciner, tas efter us.			

**Transplantationscentrum**  
Avdelning 139

EMLA® V. Jugularis till höger sida på halsen			
Premedicinering vid behov enligt GO: Stesolid 5mg P.O eller Oxascand 10mg P.O			
P-glucos på diabetiker			
<b>Efter undersökningen</b>			
Blodtryck, puls, SaO2. Kontrollera eventuella ordinationer i protokoll från kardiologlab			
Kontroll av instickställe			
Om stick i ljumske sängläge enligt ordination			
Observera biopsisvar som kommer via fax under sen eftermiddag/kväll			
<b>Vid rejektion</b>			
Efter ordinarie arbetstid: Vid biopsisvar ISHLT 2R eller ISHLT 3R kontakta bakjour för ställningstagande till rejektionsbehandling: Thoraxkirurgbakjour (patienter under första vårdtillfället efter Htx). Kardiologbakjour (senare vårdtillfällen samt polikliniska patienter). Vid biopsisvar ISHLT 0R–1R ingen åtgärd.			
Rejektionsbehandling, vanligen Solu-Medrol 1g i.v, enligt läkarordination påbörjas omgående. Om muntlig jourordination dokumenteras detta i omvårdnadsrapport.			
Vid behandlingskrävande rejektion hos poliklinisk patient rings patienten in till avdelningen för uppstart av behandling. Om jourtid fortsätter patienten med sina ordinarie läkemedel. Inskrivning och ordination i läkemedelsmodulen görs nästkommande morgon.			
Inskrivning av SSK på avd i Melior och ELVIS			
Telemetriövervakning			
P-glucos x 5			
ID-band och märkt säng			