

Mykofenolatmofetil, Cellcept

Läkemedelsbeskrivning

Infusionssubstans Cellcept 500 mg.

Immunosuppressionsmedel. Aktiv substans: Mykofenolatmofetil. Hämmar celldelningen, framför allt på lymfocyter (proliferationshämmare).

Dosering

Maxdos 1 g x 2.

Hantering

Tillhör gruppen "Särskilt farliga läkemedel". Iordningställande ska ske i säkerhetsbänk. Undvik direktkontakt med läkemedlet.

Substansen är fosterskadligt hos människor och ska ej hanteras av gravid vårdpersonal.

Skyddsklädsel: handskar, förkläde och skyddsärmor med mudd.

Plastat underlägg rekommenderas. Använd slutet system (Chemfort) vid spädning. Tvätta av arbetsytan efter beredning med ytdesinfektion 70 %. Förfyll infusionsaggregatet med spädningsvätska innan tillsättning av läkemedlet. Inspektera stamlösningen samt infusionslösningen och kontrollera så att inga partiklar eller missfärgning finns. Kassera lösningen om partiklar eller missfärgning observeras.

Spädning

Varje ampull med 500 mg torrs substans löses genom tillsats av 14 ml Glukos 5 %. Lösningen späds sedan med Glukos 5 %.

- **500 mg (ca 15 ml)** späds i 70 ml Glukos 5 %. Totalvolymen av infusionslösningen är 85 ml.
- **1000 mg (ca 30 ml)** späds i 140 ml Glukos 5 %. Totalvolymen av infusionslösningen är 170 ml.

Slutkoncentrationen för infusionslösningen, oavsett dosering, blir ca 6 mg/ml mykofenolatmofetil.

Administrering

Spola katetern med Glukos 5 % före och efter administrering. Infusionslösningen ska ges som en långsam infusion under 2 timmar antingen i en perifer eller central ven.

Blandbarhet

Läkemedlet ska administreras som singelinfusion. Får ej blandas eller ges i samma kateter som andra intravenösa läkemedel eller andra infusionslösningar.

Hållbarhet

Pulver till infusionsvätska är hållbart i 3 år.

Den färdigberedda infusionslösningen är hållbar i 12 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kylskåp.

Förvaring

Pulver till koncentrat till infusionsvätska i rumstemperatur.

Förpackning

Cellcept 500 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, 20 ml typ I injektionsflaskor. Lösning finns i förpackningar med 4 injektionsflaskor.

Åtgärder vid spill

Ska omhändertas omgående. Stora spill >5 ml rapporteras som avvikelse. Skyddsklädsel: Handskar, munskydd, skyddsrock eller förkläde med armskydd. Vid spill på oskyddad hud, skölj rikligt med vatten. Vid kontakt med ögon, använd ögondusch och ta ut eventuella kontaktlinser.