

Obligatorisk bilaga till remiss för plastikkirurgisk bedömning av vävnadsöverskott på buken

För alla patienter som är i behov av bukplastik ska en realistisk målvikt vara framtagen i överenskommelse med patient och behandlande läkare (ex obesitakirurgi, allmänläkare, gynekolog).

Vid stigande BMI ökar komplikationsrisken, varför BMI < 25 alltid ska eftersträvas!

Inför remitteringen ska målvikten vara uppnådd och patienten ska ha varit viktstabil i minst 6 månader.

Vi kräver absolut rökstopp innan patienten kommer till plastikkirurgisk mottagning för bedömning av vävnadsöverskott

Alla rubriker nedan ska vara ifyllda och ovanstående kriterier måste vara uppfyllda för att remissen ska beaktas.

Namn: _____ Personnummer: _____

Aktuell kroppslängd	cm	Aktuell vikt (målvikt)	kg
Aktuellt BMI		Rökare ja/nej	
Hur länge har patienten varit viktstabil (minst 6 månader)		Senaste förlossning, månad/år	
Antal genomgångna graviditeter			

Subjektiva besvär

Objektiva fynd

Sociala faktorer (arbete, fritid, sjukskrivning etc.)

Andra uppgifter om läkemedel eller sjukdomar (negera eller specificera):

Diabetes mellitus

Högt blodtryck

Hjärt-kärlsjukdom

Tidigare kirurgi

Gastroesofageal-reflux

Behandlingskrävande depression

Ätstörningar

Aktuella läkemedel

