

Till dig som behandlas med intravenösa antibiotika i hemmet

Vårt mål är att du ska känna dig trygg och informerad om din behandling. Denna broschyr ger viktig information till dig som kommer att få behandling med intravenösa antibiotika hemma med hjälp av elastomeriska pumpar. Kom ihåg att du kan kontakta avdelningen dygnet runt vid frågor.

Vad är en elastomerisk pump?

Pumpen som möjliggör din hembehandling kallas för elastomerisk pump. Den är en bärbar, engångsanordning som levererar kontinuerlig antibiotikainfusion. Den är utformad för att vara enkel att använda, vilket gör att du kan få din behandling hemma.

Möjliga biverkningar och oönskade effekter

Även om behandlingen med elastomeriska pumpar är säker och effektiv, är det viktigt att känna till potentiella problem och hur du hanterar dem:

1. Infektion (lokalt eller/och allmän påverkan)

- **Symptom:** Feber, frossa, rodnad, svullnad eller sekretion kring kärlkatetern
- **Förebyggande/Åtgärd:** Iaktta strikt hygien vid hantering av kärlkatetern. Kontakta avdelningen vid lokala infektionstecken. Vid allvarliga tillstånd, ring 112 för akut hjälp.

2. Trombos (Blodpropp)

- **Symptom:** Svullnad, smärta, värme eller rodnad i armen där kärlkatetern är placerad.
- **Förebyggande/Åtgärd:** Rör och använd armen regelbundet för att främja blodflödet. Om du misstänker en blodpropp, kontakta oss omedelbart.

3. Kateterrelaterade problem

- **Blockering:** Svårighet att spola katetern.
 - **Åtgärd:** Kontrollera att katetern inte är vikt. Försök spola med saltlösning. Om problemet kvarstår, kontakta oss.
- **Rubbat kateterläge (in eller ut)**
 - **Åtgärd:** Använd inte katetern. Fixera katetern med hudtejp eller plåster och kontakta oss för vidare instruktioner.

4. Biverkningar av läkemedel

- **Symptom:** Utslag, klåda, andningssvårigheter eller svullnad i ansikte och hals.
- **Åtgärd:** Stoppa infusionen omedelbart och sök akut medicinsk hjälp via 112 (andnöd/ansiktssvullnad/svimmingskänsla) eller avdelningen vid lindrigare besvär.

5. Pumpfel

- **Symptom:** Pumpen startar inte, stannar oväntat eller läcker.
- **Åtgärd:** Kontrollera att klämman är öppen och att pumpen är i rumstemperatur. Om pumpen fortfarande inte fungerar, använd en ny pump och rapportera felet till oss.

Tips för säker användning

- **Hygien:** Tvätta alltid händerna noggrant innan du hanterar pumpen eller katetern.
- **Förvaring:** Förvara pumpen på en ren, torr plats i rumstemperatur under användning. Förvara oanvända pumpar i kylskåp.
- **Övervakning:** Kontrollera regelbundet infusionsstället för tecken på infektion eller irritation.
- **Hydrering:** Drick tillräckligt med vätska för att hjälpa till att upprätthålla ett bra blodflöde och minska risken för trombos.

Kontaktinformation

- **Dygnet runt:** Du kan dygnet runt kontakta avdelningen för frågor kring behandlingen på telefonnummer _____
- **Vid akuta fall:** Ring 112 för omedelbar hjälp.

Uppföljning

Du behåller en så kallad permissionsplats på avdelningen och ortopedkliniken har fortsatt ansvar för din behandling.

Du kommer få regelbundna besök av närsjukvårdsteamet (NSVT) under din behandling. Det är viktigt att då rapportera eventuella problem eller bekymmer.

Avslutning

Övergång till antibiotika i tablettform sker först efter besök på ortopedmottagningen där din ansvariga läkare kommer göra en bedömning i samråd med infektionsspecialist.

Innan du åker hem så får du datum för NSVT-hembesök och för återbesök på ortopedmottagningen.

