

Senast reviderat: 2021-09-18

Dokumentet gäller för: Verksamhet Öron-, näs- och halssjukvård

Innehållsansvarig: Gunnhildur Gudnadottir, sektionschef, överläkare ÖNH

Tonsillektomi- standardiserad metod för operation och hemostas

Detta dokument beskriver den rekommenderade operations- och hemostatekniken för tonsillektomi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syfte

Syftet med denna rutin är att standardisera tonsillektomi på ÖNH-kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Målsättningen är att minimera risken för postoperativ blödning. Detta kan uppnås genom att operera bort tonsiller kallt och genom att i högre utsträckning uppnå hemostas med kalla tekniker.

Arbetsbeskrivning


Rutinen beskriver genomförandet av kirurgiskt borttagande av tonsiller och hemostas i tonsilloberna.

Rutin för tonsillektomi

Tonsiller opereras bort genom kall dissektion. Åtkomst till det tonsillära spatiet skapas genom skarp incision i slemhinnan vid övre tonsillpolen. Trubbig dissektion sker med kalla stålinstrument.

Lokalbedövning med eller utan adrenalin är inte nödvändigt.

Efter borttagande av tonsill utförs blodstillning enligt nedanstående flödesschema.



Postadress:

Öron-, näs- och halsverksamhet
Öron-, näs- och halssjukvård
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

Ansvar

Det är varje läkares ansvar att följa rutinen. Utbildning av nya läkare sker genom handledare.

Kunskapsöversikt

Post-tonsillectomy haemorrhage rates are related to technique for dissection and for haemostasis. An analysis of 15734 patients in the National Tonsil Surgery Register in Sweden. Hessén-Söderman et al. Clin Otolaryngol 40;3:248-254, June 2015.

Risk factors for postoperative hemorrhage following tonsillectomy. Tomkinson et al. The Laryngoscope 121:279-288, 2011.

Impact of NICE guidance on rates of haemorrhage after tonsillectomy: an evaluation of guidance issued during an ongoing national tonsillectomy audit. Cromwell et al. Qual Saf Health Care 2008;17:264-268.

Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen har ansvarig vårdenhetsöverläkare för operation ÖNH. Uppföljning av återinläggningsfrekvens pga blödning efter tonsillektomi kan följs upp genom data från det nationella kvalitetsregistret för tonsilloperation.

Granskare/arbetsgrupp

Gunnhildur Gudnadottir, Överläkare ÖNH/ SU
Anders Ebenfelt, Vårdenhetsöverläkare ÖNH/SU
Lars Pedersen, Specialistläkare ÖNH/ SU

Postadress:

Öron-, näs- och halsverksamhet
Öron-, näs- och halssjukvård
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se