



## Till dig som ska behandlas med Dapson

Läkemedelsform: Kapsel hård 50 mg

### Vad är Dapson?

Dapson är ett läkemedel som har använts sedan 1950-talet av hudläkare för behandling av dermatitis herpetiformis (svårt kliande hudsjukdom) och blås- och blodkärslssjukdomar. Läkemedlet har utvecklats från sulfa och det är därför viktigt att du meddelar din läkare om du är överkänslig mot sulfa.

Dapson verkar genom att förhindra inflammation i huden men exakt hur detta går till är okänt.

Vid dermatitis herpetiformis brukar Dapson ge snabb minskning av klåda och utslag, ofta redan inom 3 dagar. Påverkan på tarmslemhinnan som finns vid dermatitis herpetiformis motverkas inte av Dapson och det är därför viktigt att äta glutenfri kost vid denna diagnos.

Vid behandling av andra blås- och blodkärslssjukdomar kommer effekten efter varierande tid.

Du behöver inte äta glutenfri kost vid dessa diagnoser eftersom de saknar koppling till glutenöverkänslighet.

### Dosering

Behandlingen inleds ofta med en lägre provdos och sedan ökas dosen gradvis tills besvärsfrihet. Vid förbättring kan underhållsdosen minskas.

### Kontroller

Blodprover tas innan behandlingen påbörjas samt 1 vecka, 4 veckor och 12 veckor efter start. Därefter var 3:e månad första året. Vid stabil behandling kan provtagningen glesas ut enligt ordination av din läkare.

Blodprover omfattar blodceller och njurfunktion.

### Uppföljning

Vid insättande av systembehandling ska effekten utvärderas efter 3–4 månader - då bör en påtaglig förbättring ses. Ibland kan det dock ta ända upp till 6 månader innan full effekt uppnås. När man uppnått behandlingsmålen sker uppföljning normalt årligen. Uppföljning kan ske via frågeformulär som vi skickar ut via 1177 (alternativt brev). Om du blir försämrad och behandlingen inte fungerar bra vill vi att du kontaktar oss.



## Möjliga biverkningar

Eventuella biverkningar är illamående, kräkningar, huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, oro och insomningssvårigheter.

Dapson påverkar de röda blodkropparna så att deras överlevnadstid förkortas något. Kroppen kompenserar för detta genom nybildning av röda blodkroppar men ibland kan lätt blodbrist (anemi) uppstå vid doser som överstiger 100 mg Dapson per dag. Detta kontrolleras genom regelbunden provtagning.

**En ovanlig biverkan** är påverkan på de vita blodkropparna som kraftigt minskar i antal. Man får då halsont, hög feber och frossa, det vill säga samma som symptom som vid en svår halsinfektion. Det är viktigt att kontrollera de vita blodkropparna med blodprov akut om sådana symptom skulle uppstå.

**Av detta följer att du ska kontakta jourhavande hudläkare via Sahlgrenska Universitetssjukhusets växel 031-342 10 00 om du:**

- får tecken på infektion så som feber eller frossa
- får blåmärken lättare än tidigare eller blödning
- blir ovanligt trött, blek
- noterar mörkfärgad urin och/eller gulaktig ton i ögonvitor och på huden och/eller buksmärtor

## Andra läkemedel

Du måste informera din läkare om alla övriga läkemedel som du använder (inklusive naturpreparat och kosttillskott) eftersom de kan påverka eller påverkas av Dapson. Läkemedel där det är känt att risk kan föreligga vid kombination med Dapson är Metotrexat, Probecid, Rifampicin, Trimetoprim och Waran.

**Vid sjukvårdskontakter – tala alltid om att du behandlas med Dapson!**

## Kontakt

Hudbehandling och dagsjukvård Sahlgrenska 031-342 11 12 (Telesvar)

Växel Sahlgrenska (dygnet runt) 031-342 10 00

Du kan också nå oss via Vårdguidens e-tjänster på [www.1177.se](http://www.1177.se) eller [www.sahlgrenska.se](http://www.sahlgrenska.se)

Sjukvårdsrådgivningen nås dygnet runt på telefonnummer 1177