



## Basaliom fryskirurgisk behandling

معلومات للمريض

عيادة الأمراض الجلدية، مستشفى سالجرينسكا الجامعي (Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

### المعالجة بالتبريد لسرطانة الخلايا القاعدية

لقد تم علاج سرطانة الخلايا القاعدية خاصتك بالتبريد اليوم. يتغير لون الجلد بعد المعالجة مباشرةً إلى اللون الأحمر وتشعر بالحرق في المنطقة المعالجة. قد يتشكل خلال ساعتين بعد المعالجة بالتبريد انتفاخاً في هذه المنطقة، وفي حالات نادرة قد تتشكل فقاعة مائية صغيرة تحت الجلد. يعتبر هذا الأمر طبيعياً. يحدث هذا الانتفاخ غالباً بعد المعالجات التي تتم حول العين أو في جبهة الرأس أو في المنطقة العلوية من الأنف.

قد تتسرب السوائل من الجرح خلال الأيام الأولى. قم يومياً بتبديل الضماد مرتين إلى ثلاث مرات عند الحاجة خلال الأيام الأولى. نظف الجرح بواسطة الماء والصابون. قم عند تبديل الضماد بقصه على حجم الجرح من ثم تثبيته بواسطة شريط لاصق ناعم. يمكنك ترك الجرح دون ضماد قدر المستطاع عند تشكل قشرة الجرح. يمكن بعد مرور بضعة أسابيع إزالة قشرة الجرح الجافة.

غالباً ما يشفى الجرح بشكل تام بعد ما بين 4 و 6 أسابيع. قد تتشكل بعد الشفاء علامة فاتحة أو ضاربة للبياض في المنطقة المعالجة بالتبريد، وذلك لأن خلايا الجلد الصبيغية تتأثر من المعالجة. أما في حال كان الورم ينمو في شكل عميق ويتطلب معالجة بالتبريد في صورة أشد، فقد تتشكل ندبة في هذه المنطقة. إن هذا الأمر طبيعي وليس علامة على أن الورم ما زال موجوداً. يتغير مع مرور الزمن لون الندبة إلى البياض وتصبح أرفع وأنعم.