SAHLGRENSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSET
VGR

Verksamhet Hud- och könssjukvård

Patientinformation
arabiska
2020-04-07

Fryskirurgisk behandling av aktinisk keratos

لقد تم علاج التقران السفعي خاصتك بواسطة التبريد اليوم. يتغير لون الجلد بعد المعالجة مباشرةً إلى اللون الأحمر وتشعر بالحرق في المنطقة المعالجة. قد يتشكل خلال ساعتين بعد المعالجة بالتبريد انتفاخاً في هذه المنطقة، وفي حالات نادرة قد تتشكل فقاعة مائية صغيرة تحت الجلد. يعتبر هذا الأمر طبيعياً!

يحدث هذا الانتفاخ المحتمل غالباً بعد المعالجات التي تتم حول العين أو في جبهة الرأس أو في المنطقة العلوية من الأنف.

قد تصبح المنطقة الجلدية المعالجة بالتبريد عُرضةً للجرح خلال الأيام الأولى. نظف الجرح بواسطة الماء والصابون. ينبغي أن تبقى دون ضماد قدر المستطاع. لكن يمكن حماية هذه المنطقة بواسطة ضماد رفيع عند الحاجة.

يُنصح إلى استخدام الضماد بقصه على حجم الجرح من ثم تثبيته بواسطة شريط لاصق ناعم.

غالباً ما تشفى المنطقة المعالجة بشكل تام بعد ما بين أسبوع إلى أسبوعين، لكن قد يتشكل في بعض الأحيان علامة فاتحة أو ضاربة للبياض في المنطقة المعالجة بالتبريد، وذلك لأن خلايا الجلد الصبغية قد تتأثر من المعالجة.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
031-342 10 00 - sahlgrenska.se

J. Paoli, H. Ceder