



## معلومات للمريض

عيادة الأمراض الجلدية، مستشفى سالغرينسكا الجامعي

## المعالجة بالتبريد للطور التمهيدي لسرطانة حرشفية الخلايا

لقد تمت معالجتك اليوم بواسطة المعالجة بالتبريد بخصوص الطور التمهيدي لسرطانة حرشفية الخلايا. سيصبح لون الجلد مباشرةً بعد المعالجة أحمر وتشعر بلسع في المنطقة المعالجة. سيحدث خلال ساعتين بعد المعالجة بالتبريد انتفاخاً في هذه المنطقة. قد تشكل فقاعة جلدية تحتوي على السوائل أو الدم. إن هذا الأمر طبيعي جداً. يكون الانتفاخ أكثر وضوحاً بعد المعالجة حول العين أو في جبهة الرأس أو في الجزء العلوي من الأنف.

قد تتسرب السوائل من الجرح خلال الأيام الأولى. قم يومياً بتبديل الضماد مرتين إلى ثلاث مرات عند الحاجة خلال الأيام الأولى. نظف الجرح بواسطة الماء والصابون. قم عند تبديل الضماد بقصه على حجم الجرح من ثم تثبيته بواسطة الشريط اللاصق الناعم. يمكنك ترك الجرح دون ضماد قدر المستطاع عند تشكل قشرة الجرح. يمكن بعد مرور بضعة أسابيع إزالة قشرة الجرح الجافة.

غالباً ما يشفى الجرح بشكل تام ما بين 4 و 6 أسابيع. قد تتشكل بعد الشفاء علامة فاتحة أو ضاربة للبياض في المنطقة المعالجة بالتبريد، وذلك لأن خلايا الجلد الصبغية تتأثر من المعالجة. قد تتطلب معالجة بالتبريد بشكل أشد، وبالتالي قد تتشكل ندبة في هذه المنطقة. إن هذا الأمر طبيعي وليس علامة على أن الورم ما زال موجوداً. يتغير مع مرور الزمن لون الندبة إلى البياض وتصبح أرفع وأنعم.