



Curettage – electrodesiccation (bortskrapning + bränning)

قد يحدث تورم متوسط في الأيام التي تلي عملية التجفيف الكهربائي (كشط + كوي بالحرق) لأورام الجلد. يتم تنظيف الجرح بالماء والصابون. قم بتغطية الجرح بضماد (ضمادة ولاصق ناعم) إذا لزم الأمر ولكن يُشفى الجرح بشكل أفضل دون ضماد.

قد يفرز في نهاية الأسبوع الأول ما بعد المعالجة سائل قيحي يميل إلى لون الدم من قشرة الجرح. تدل هذه العلامة الطبيعية على أن القشرة بدأت بالانحلال (ليست أعراضاً على الإصابة بعدوى). يتم تنظيف سائل الجرح الجاف بواسطة الماء والصابون. يمكن في معظم الأحيان خلال الأسبوع الثاني أو الثالث إزالة القشرة الجافة التي قد تشكلت.

قد يحدث نزيف خلال الأسبوعين الأوليين. قم بوضع ضماد أو ما يشابه ذلك على الجرح بشكل مستمر لمدة عشر دقائق تقريباً حتى يتوقف النزيف.
قد يصبح لون الندبة أحمر ويُشعر على أنها سميقة بعد شفاء الجرح. إن هذا الأمر طبيعي وليس مؤشراً على أن الورم لا يزال مستمراً. تصبح الندبة مع مرور الوقت لامعة وأكثر رفعة ونعومة.