

Hudbiopsi

يُقصد بخزعة الجلد أخذ قطعة من الجلد يبلغ حجمها بضع مليمترات ليتم إرسالها للتحليل. يتم ذلك من أجل الحصول على المساعدة في تشخيص المرض الجلدي.

لقد تسبب أخذ خزعة الجلد بوجود جرح دائري صغير. يستغرق شفاء هذا الجرح تقريباً أسبوعين وسيحدث مكانه ندبة بيضاء صغيرة الحجم.

هل يسبب ذلك ألماً فيما بعد؟

يقل تأثير التخدير الموضعي بعد مضي ساعة إلى ساعتين. عادةً لا تشعر بأي ألم، ولكن في حال شعرت بالألم فيمكنك استخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية من مستحضرات الباراسيتامول على سبيل المثال، ألفيدون (Aivedon) أو بانوديل (Panodil). تجنب استخدام مسكنات الألم الأخرى لأنها قد تكون مانعة لتجلط الدم.

كيف يجب علي الاعتناء بالجرح؟

- ابق الضماد جافاً خلال ٤٨ ساعة الأولى.
- قم بإزالة الضماد بعد مضي ٤٨ ساعة. نظف الجرح بالصابون والماء. نقوم في بعض الأحيان بقطع النزيف بواسطة كلوريد الحديد والذي من شأنه أن يجعل الجرح لونه أسود مائل للصفار. يمكن تنظيفه ولا يعتبر خطيراً.
- قم بعد ذلك بتجفيفه من خلال الطبطبة. من ثم ضع ضماد خفيف جديد عند الحاجة (في حال كان الجرح لا يزال يفرز السوائل) من ثم قم بحماية الجرح من البيئات المتسخة.
- قم بتنظيف الجرح يومياً وفقاً لما ذكر أعلاه حتى يُشفى تماماً.
- في حال كان الجرح في الساق، فيجب عليك استخدام جوارب داعمة حتى يُشفى الجرح تماماً.
- تجنب حمامات البخار وحمامات السباحة حتى يُشفى الجرح تماماً.

النزيف

إن حدوث نزيف من الجرح أمر غير شائع. ولكن في حال حدوث ذلك، فقم بالجلوس والضغط بقوة واستمرار على الضماد لمدة ١٥ دقيقة على الأقل. لا تتعجب من حدوث كدمات في حال تم أخذ الخزعات من مناطق حساسة على سبيل المثال قريبة من العيون.

علامات الالتهاب

من المتوقع أن يصبح الجرح أحمر اللون ومتورماً ومؤلماً خلال الأيام الأولى بعد أخذ الخزعة. من غير الشائع الإصابة بالعدوى بعد الخزعات، ولكن إذا تسبب الجرح فجأة بألم أكبر أو أصبح أكثر حرارة واحمراراً وانتفاخاً، فقد يدل ذلك على حدوث عدوى. قم حينها بالتواصل معنا أو مع الرعاية الطبية.

يتم إرسال خزعة الجلد التي تم أخذها للفحص المجهرى، وسيتم إخطارك بالنتيجة عادةً في غضون ٦ إلى ٨ أسابيع، وذلك إما عن طريق البريد أو عبر الهاتف بموجب الاتفاقية مع طبيبك.