



Hudbiopsi med suturer

يُقصد بخزعة الجلد أخذ قطعة من الجلد يبلغ حجمها بضع مليمترات ليتم إرسالها للتحليل. يتم ذلك من أجل الحصول على المساعدة في تشخيص المرض الجلدي.

لقد تم تقطيب مكان أخذ خزعة الجلد. سبب ذلك ندبة صغيرة في مكان الخزعة.

هل يسبب ذلك ألماً فيما بعد؟

يقال تأثير التخدير الموضعي بعد مضي ساعة إلى ساعتين. عادةً لا تشعر بأي ألم، ولكن في حال شعرت بالألم فيمكنك استخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية من مستحضرات الباراسيتامول على سبيل المثال، ألفيدون (Alvedon) أو بانوديل (Panodil). تجنب استخدام مسكنات الألم الأخرى لأنها قد تكون مانعة لتجلط الدم.

كيف يجب عليّ الاعتناء بالجرح؟

- ابق الضماد جافاً خلال ٤٨ ساعة الأولى.
- يمكنك الاستحمام بعد مرور يوم كامل وأنت مرتدي الضماد. قم بتبديله إذا لزم الأمر.
- يجب أن يبقَ الضماد الضاغط جافاً لمدة يومين. يتم إزالة الضماد الضاغط بعد مرور اليومين، لكن يجب إبقاء اللاصق الورقي البني المجاور للقطب. يمكنك بعد ذلك الاستحمام كالمعتاد. قم بالتجفيف من خلال الطبقة.
- عليك خلال الأيام الأولى تجنب تناول مسكنات الألم التي من شأنها زيادة قابلية النزيف، خاصة المحضرة من أسيتيل ساليسيل على سبيل المثال، إيبيرين (Ipren) ومغنيسيل (Magnecyl) وتريو (Treo)، بالإضافة إلى بعض المستحضرات الغذائية على سبيل المثال، الحمض الدهني أوميغا ٣ وكبسولات زيت كبد الحوت. لكن في حال كانت لديك وصفة مانعة لتجلط الدم، فتناولها كالمعتاد.
- عليك تجنب الإجهاد البدني خلال الأسابيع الأولى.
- في حال كان الجرح في الساق، فيجب عليك استخدام جوارب داعمة حتى يُشفى الجرح تماماً.
- تجنب حمامات البخار وحمامات السباحة حتى يُشفى الجرح تماماً.
- قم بحجز موعد في المستوصف خاصتك من أجل إزالة القطب.

سيتم إزالة القطب بعد أيام.

النزيف

إن حدوث نزيف من الجرح أمر غير شائع. ولكن في حال حدوث ذلك، فقم بالجلوس والضغط بقوة واستمرار على الضماد لمدة ١٥ دقيقة على الأقل. لا تتعجب من حدوث كدمات في حال تم أخذ الخزعات من مناطق حساسة على سبيل المثال قريبة من العيون.

علامات الالتهاب

من المتوقع أن يصبح الجرح أحمر اللون ومتورماً ومؤلماً خلال الأيام الأولى بعد أخذ الخزعة. من غير الشائع الإصابة بالعدوى بعد الخزعات، ولكن إذا تسبب الجرح فجأة بألم أكبر أو أصبح أكثر حرارة واحمراراً وانتفاخاً، فقد يدل ذلك على حدوث عدوى. قم حينها بالتواصل معنا أو مع الرعاية الطبية.

يتم إرسال خزعة الجلد التي تم أخذها للفحص المجهرى، وسيتم إخطارك بالنتيجة عادةً في غضون ٦ إلى ٨ أسابيع، وذلك إما عن طريق البريد أو عبر الهاتف بموجب الاتفاقية مع طبيبك.