



## Information efter PDT-behandling

لقد تمت معالجتك بواسطة العلاج الضوئي الديناميكي من أجل:

قد يستمر الألم ليوم واحد بعد الانتهاء من المعالجة، ولكن ذلك فقط في الحالات النادرة. يمكن إذا لزم الأمر تناول مسكنات الألم مثل بانوديل (Panodil®) أو إيبيرين (Ipren®) ولكن لا تتجاوز الحد المسموح به. قد يحدث انتفاخاً، خاصةً في المنطقة المحيطة بالعين والرم. إن هذا الأمر طبيعي ويزول تدريجياً.

تبقى المنطقة حساسة للضوء لمدة يومين بعد المعالجة. من المهم أن تحميها من أشعة الشمس، خاصة في فصلي الربيع والصيف.

قد تظهر بعد مرور حوالي يومين جروح سطحية في المنطقة المعالجة. إن هذا الأمر طبيعي. حافظ على نظافة الجروح واتركها جافةً. يمكنك الاستحمام كالمعتاد، ولكن لا يُنصح بالسباحة وحمامات البخار. يمكنك وضع ضماد جاف في حال أفرز الجرح سوائل.

لا يجب استخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات في المنطقة المعالجة قبل أن يُشفى الجلد تماماً. تجنب أيضاً الحلاقة. يتعافى الجرح عادةً بعد ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

أما بالنسبة لمن تم تخديره عند المعالجة، خاصةً في المنطقة المحيطة للرم والشفاه، فإنه من المهم أن تعلم أن المخدر يستمر مفعوله طويلاً ويصل حتى 6 ساعات. لذلك كن حذراً عند تناول الطعام وشرب السوائل الساخنة.

يمكنك الاتصال بنا في حال واجهتك أية مشكلة أو كان لديك أية استفسار.

Hudbehandling och dagsjukvård Sahlgrenska  
Verksamhet Hud- och könssjukvård  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Tel. 031-342 11 12