

Fryskirurgisk behandling av basaliom

Du har idag blivit frysbehandlad för ett basaliom. Direkt efter behandlingen blir huden röd och det svider i området. Under ett par timmar efter frysbehandlingen bildas en svullnad i området som behandlats. Ibland uppkommer också en vätske- eller blodfylld blåsa. Detta är helt normalt. Svullnaden märks allra mest om behandlingen utförts runt ett öga, i pannan eller på övre delen av näsan.

De första dagarna kan såret också vätska sig. Byt förband om så behövs 2-3 gånger dagligen de första dagarna. Tvätta såret med tvål och vatten. Vid omläggningen klipp en kompress så stor som såret och sätt fast den med en hudvänlig häfta. Använd inte något täckande/tätt förband. När en sårskorpa börjar bildas kan du ha såret utan förband så mycket som möjligt. Efter någon vecka kan man oftast avlägsna den torra skorpan.

Såret läker normalt på cirka 4-6 veckor. Det kan ibland läka med ett ljusst eller vitaktigt märke i det frysbehandlade området eftersom hudens pigmentceller påverkas av behandlingen. Om tumören växer på djupet och kräver en hårdare frysbehandling så kan det uppstå ett ärr i området efteråt. Detta är normalt och inte ett tecken på kvarstående tumör. Med tiden blir ärret oftast blekare, tunnare och mjukare.