

Information efter PDT-behandling

Du har fått PDT-behandling för _____

Efter behandlingen kan smärta i undantagsfall kvarstå till dagen därpå. Vid behov kan smärtstillande läkemedel med paracetamol eller ibuprofen användas upp till maxdos. Svullnad kan uppstå, särskilt i området runt ögon och mun. Detta är normalt och lägger sig så småningom.

Efter behandlingen är området fortfarande ljuskänsligt i 48 timmar. Det är därför viktigt att helt undvika solljus de första två dagarna, särskilt vår och sommartid.

För bästa kosmetik och för att undvika mer UV-skada framåt rekommenderas adekvat solskydd i första hand kläder eller huvudbonad, gärna en hatt med brätte. Som komplement till hud som ej täcks av kläder, till exempel ansikte, rekommenderas solkräm med minst solskyddsfaktor 30, märkt med UVA-symbol.

Efter cirka 2 dagar kan en ytlig sårighet uppstå i det behandlade området. Detta är normalt. Håll såren rena och torra. Du kan duscha och tvätta dig som vanligt, men bad och bastubad rekommenderas inte. Om såren skulle vätska sig kan du lägga på ett torrt förband.

Make-up eller krämer ska inte användas på det behandlade området innan huden är läkt. Undvik även rakning. Sårigheten läker inom cirka 2–3 veckor.

För dig som har fått bedövning i samband med behandlingen, särskilt runt mun och läppar, är det viktigt att tänka på att bedövningen är långtidsverkande och kan sitta i upp till 6 timmar. Var därför extra försiktig när du ska äta eller dricka något varmt.

Skulle det uppstå några problem eller om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Hudbehandling och dagsjukvård Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel. 031-342 11 12