

## Till dig som ska behandlas med Skilarence

**Läkemedelsform:** Enterotablett finns i 30 mg och 120 mg.

### Vad är Skilarence?

Skilarence är ett läkemedel för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Innehåller det aktiva ämnet dimetylfumarat. Skilarence påverkar cellerna i immunsystemet (kroppens naturliga försvar). Det förändrar immunförsvarets aktivitet och minskar produktionen av ämnen som bildas vid psoriasis.

### Dosering

Det finns i 2 olika styrkor och den lägre styrkan används för start och upptrappning av din behandling. Den högre styrkan används när du ökar din dos och för underhållsbehandling. Skilarence kan tas 1 till 3 ggr/dag (högst 6 tabletter/dag = 720 mg). Skilarence är gastro-resistent tablett vilket innebär att den har en beläggning som är utformad så att tabletterna inte löses upp i magsäcken utan frigör först läkemedel när den kommer till tarmen. Detta förhindrar irritation i magen. Det brukar ta flera veckor, ibland månader, tills man får en full effekt av behandling med Skilarence.

### Hur tar jag Skilarence?

För att minimera risken för gastrointestinala biverkningar bör Skilarence tas hela (får inte krossas, delas eller tuggas) i samband med måltid.

Genom att börja med en låg dos och öka gradvis under flera veckor minskas risken för biverkningar.

### Kontroller

Innan behandlingen påbörjas tas blodprover som omfattar blodceller, njur- och leverfunktion, urinprov samt graviditetstest för kvinnor. Efter start kontrolleras blodceller, njur- och leverfunktion samt urinsticka var 3:e månad.

### Uppföljning

Vid insättande av systembehandling ska effekten utvärderas efter 3–4 månader - då bör en påtaglig förbättring ses. Ibland kan det dock ta ända upp till 6 månader innan full effekt uppnås. När man uppnått behandlingsmålen sker uppföljning normalt årligen. Uppföljning kan ske via frågeformulär som vi skickar ut via 1177 (alternativt brev). Om du blir försämrad och behandlingen inte fungerar bra vill vi att du kontaktar oss.

### Biverkningar

De biverkningar som kan förekomma är i princip av två olika typer, dels de som du märker själv och som oftast är ofarliga, dels de som visar sig i blodproverna. Vanligaste biverkningarna är diarré, gasbildning, kräkningar, huvudvärk samt rodnad i ansiktet eller på kroppen. Påverkan på blodceller och levern ger sällan obehag utan märks först vid blodprovskontroller.

### Vid sjukvårdskontakter – tala alltid om att du behandlas med Skilarence!

Du kan alltid kontakta oss på telefon 031-342 11 12 (telesvar) eller via e-tjänster på [www.1177.se](http://www.1177.se)