

Fryskirurgisk behandling av ögonnära basaliom

Du har idag blivit frysbehandlad för ett basaliom i ögonområdet. Några timmar efter behandlingen bildas en kraftig svullnad i området som behandlats. Ögat kan bli nästan helt igensvullet dagarna efter. En svullnad kan även uppstå runt det obehandlade ögat.

Svullnaden kan sitta i mellan sju och tio dagar. Detta är helt normalt. Du kan även ha värk under de första dagarna efter behandlingen. Du kan ta tablett Alvedon eller Panodil vid behov.

Efter behandlingen bildas ett sår. De första dagarna kan såret vätska sig. Tvätta såret med tvål och vatten. Byt förband om så behövs 2–3 gånger dagligen de första dagarna. Du kan stryka på antibiotikasalva på såret och i ögat morgon och kväll tills återbesök hos sjuksköterska/undersköterska.

Såret läker normalt på cirka 3–6 veckor. Huden i det behandlade området kan bli ljusare eftersom hudens pigmentceller påverkas av behandlingen. Om tumören växer på djupet och kräver en hårdare frysbehandling så kan det uppstå ett ärr i området efteråt. Detta är normalt och inte tecken på kvarstående tumör. Med tiden blir ärrret oftast blekare, tunnare och mjukare.

Om det har blivit en förlust av ögonfransar i samband med frysbehandlingen brukar dessa inte komma tillbaka.